



Mi Universidad

Super Nota

Nombre del Alumno: Ana Karen Cancino Borraz

Nombre del tema: Patologías en conejos

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Patología y técnicas quirúrgicas de aves y conejos

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: Quinto

PATOLOGIA EN CONEJOS

RINITIS INFECCIOSA Y NEUMONÍA

Afección respiratoria de las fosas nasales que se manifiesta de forma subaguda o crónica caracterizada por producir prurito nasal, estornudos y mucosidades en los orificios de los ollares. Causado por diversos gérmenes, mala ventilación, exceso de polvo, cambios de temperatura.



LESIONES:

- Rinitis catarral
- Inflamación de las fosas nasales
- Mucosidades densas, espesas de color blanquecino amarillento, verdoso.



SINTOMAS:

- Estornudos
- Expulsión violenta de gases
- Rinitis crónica
- Se rascan la nariz



TRATAMIENTO:

- Cloranfenicol
- Lavar fosas nasales con agua boricado al 3%

DERMATOFITIS

Se denomina tiña o dermatomicosis una afección fito parasitaria de la piel que afecta a los conejos de todas las edades y de forma particular a los gazapos. Las zonas más afectadas son la frente, órbitas, nariz, labios y base de las orejas. Los hongos causantes de la tiña son muy variados, aunque la mayoría de casos corresponden a infestaciones por hongos pertenecientes a los géneros Trichophyton y Microsporium.



TRANSMISIÓN:

Los elementos de transmisión son los esporos, los cuales se suelen contaminar a través del pelo— por vía directa — o transmitirse por mediación de utensilios contaminados: jaulas, ropas, tolvas, bebederos, etc.



SÍNTOMAS:

La tiña produce síntomas locales consistentes en placas redondeadas u ovaladas sin pelo, afectando a la nariz, labios, mentón, órbitas oculares, base de las orejas y, en casos más extremos, flancos, dorso, grupa y abdomen.



TRATAMIENTO:

- Bendazol
- Antisépticos
- Sulfonamidas
- Medidas higiénicas

SARNA

Sarna Psoróptica Auricular (Otocariasis) La Otocariasis, sarna de la oreja o sarna auricular es una enfermedad parasitaria, significativa por las lesiones que causa al interior de la oreja. El parásito causante de la sarna auricular es un ácaro conocido desde muchos años y que recibe el nombre de Psoroptes Cuniculi.



SINTOMAS:

- Prurito intenso
- Otitis
- Convulsiones
- Oreja caliente y dolorosa
- Formaciones costrosas malolientes
- Vértigo
- Agalactia



DIAGNOSTICO:

El diagnóstico será etiológico si se identifican los Psoroptes cuniculi en las costras, para lo cual basta el simple auxilio de una lupa.



TRATAMIENTO:

- Hidrocarburos clorados
- Órganos fosforados
- Insecticidas minerales
- Insecticidas vegetales

PAPILOMATOSIS

El virus del papiloma de Shope es un virus de ADN y un miembro del grupo de los papovavirus. Esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en conejos de cola de algodón del Medio Oeste con brotes en conejos domésticos.



TRANSMISIÓN:

Se ha demostrado la transmisión vectorial de artrópodos mordedores de la enfermedad natural.



SIGNOS:

Los focos cutáneos rojos y elevados se convierten en crecimientos verrugosos de las orejas y los párpados. La incidencia de los papilomas se observa en zonas con poco pelo, como son los alrededores del ojo, orejas, labios y ano. Las verrugas empiezan en el punto de infección.



TRATAMIENTO:

La escisión quirúrgica con un amplio margen es la mejor opción para eliminar las verrugas del papiloma.


ABSCESO DENTARIO MALOCCLUSIÓN DENTAL

Una de las enfermedades más comunes en los conejos es el sobrecrecimiento dental. Esta enfermedad afecta a los incisivos, a los molares y a los premolares. Los dientes acostumbran a crecer 5 milímetros al mes, y por ello es tan importante ofrecer alimentos para roer a tu conejo.



CAUSAS:

Una de las principales causas es una alimentación incorrecta. Las dietas ricas en fibra favorecen el desgaste durante la masticación por su efecto abrasivo sobre los dientes. Otra de las causas sería patologías genéticas como puede ser el prognatismo en mandibular, que consiste en que la mandíbula y el maxilar no son iguales y al cerrar la boca no se produce el desgaste de los dientes por roce entre ellos.



TRATAMIENTO:

Su tratamiento consiste en hacerle una incisión al absceso, drenarlo y tratar el conejo con antibióticos. La combinación de penicilina y estreptomina tiene como resultado un antibiótico eficaz para el tratamiento de esta condición.

AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES

Las amputaciones parciales de extremidades y las prótesis (extremidades artificiales) en mascotas, son una nueva opción de tratamiento para algunos pacientes. Como ocurre con otros procedimientos, no es una buena opción para todas las mascotas ni para todos los dueños.



MANIFESTACIONES CLINICAS:

Es posible que la amputación se recomiende debido al cáncer, un traumatismo grave o un defecto de nacimiento que ha generado una pata inútil. Se puede necesitar una amputación por otros motivos como una pata dolorosa, una que no se utiliza, o una extremidad con una herida o fractura que no se puede curar debido a innumerables motivos.



DIAGNOSTICO:

- Análisis de sangre
- Radiografías

TRATAMIENTO:

En el caso de una pata delantera, la amputación que tiene más éxito y mejores resultados estéticos es la "desarticulación escapulotorácica": se extirpa toda la extremidad desde los dedos hasta el omóplato (paletilla).