Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Francisco de Jesús Álvarez Velasco

Nombre del tema: Patologías en conejos

Parcial: 3

Nombre de la Materia: Patologías y técnicas quirúrgicas en aves y conejos

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 5

Patologías en conejos

Enteritis mucoide

La E.M es:

Las enteritis producidas por excesos de proteínas se les denomina enterotoxemia.

Las causantes de esto son las bacterias Clostridium spiriforme y Escherichia Coli, las cuales son huéspedes normales del tracto digestivo de los animales

Afecta mas a:

Esta enfermedad afecta a los conejos adultos y también los gazapos

El microbio interviene por la secreción de una toxina que atraviesa la pared del intestino y provoca lesiones orgánicas rápidamente mortales

Causas de la patología:

Se ha demostrado que la incidencia de esta enfermedad es mayor cuando se alimentan conejos con dietas bajas en fibra, y altas en energía

Síntomas de la enfermedad:

- atonía digestiva
- vientre abultado, dejan de alimentarse y se niegan a beber
- No se mueven en su jaula
- Dejan de copular
- Muerte del animal
- que presenta una diarrea liquida tras haber presentado una severa constipación.

lesiones:

- abundancia de gases en el intestino delgado extremadamente dilatado y vacío de todo alimento.
- varias zonas hemorrágicas a nivel del intestino grueso
- El hígado está descolorido, amarillento, con este aspecto de hígado cocido
- Los otros órganos
- presentan igualmente coloraciones anormalmente pálidas

El tratamiento es:

Antibióticos de amplio espectro

sueroterapia

Tizzer

La enf. De T:

Presenta casi los mismos síntomas que la enterotoxemia, excepto que en el examen después de muerto se observan unas manchas blancas en el hígado del tamaño de granos de sal

La bacteria Bacillus piliformes causa la enfermedad

Síntomas de la enfermedad:

- Cuadro agudo
- en los que se observa anorexia
- debilidad
- diarrea líquida a pastosa

muerte en 12-72 horas

- Cuadro crónico
- pérdida de peso
- diarrea líquida
- muerte hasta 6-8 semanas después de la aparición de

lesiones:

- lesiones hepáticas son las más típicas
- en el intestino edema en la serosa
- El ciego normalmente aparece con material acuoso
- necrosis en miocardio y los ganglios mesentéricos

Diagnostico:

Únicamente sintomatico

El tratamiento es:

Se recomienda una buena profilaxis, desinfectando cualquier material que haya estado en contacto con animales enfermos

Pseudotuberculosis

La PS. es:

Pseudotuberculosis es una zoonosis cuyo reservorio son pequeños roedores, conejos, ciervos y aves

Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Yersinia pseudotuberculosis

Síntomas:

- Los síntomas característicos son falta de apetito, depresión, enflaquecimiento y muerte
- Fiebre.
- Dolor abdominal.
- Diarrea

causas:

Es común en conejeras de pobre higiene

Que diagnostico presenta:

El diagnóstico se realiza por necropsia la cual ofrece, tubérculos gaseosos de tamaño variable en hígado, bazo y especialmente en los ganglios mesentéricos.

El tratamiento es:

La enfermedad no responde a tratamientos y también para evitar infecciones del hombre, se debe eliminar todos los animales sospechosos

Sífilis de conejo

El S,C es:

La sífilis se conoce también con el nombre de Espiroquetosis

Enfermedad venérea, La bacteria llamada Treponema cuniculi causa la sífilis en los conejos.

Patogenia:

El periodo de incubación es variado y prolongado ya que las lesiones pueden aparecer entre las 3 a 6 semanas después de la exposición

lesiones:

Las primeras lesiones de esta enfermedad suelen aparecer generalmente en el perineo y en los genitales

Síntomas:

- Escozor.
- Dolor.
- Irritación de las zonas afectadas.
- Problemas en la reproducción.
- Inapetencia

Que diagnostico presenta:

- Pruebas serológicas.
- PCR.
- ELISA.

PRR

Se previene:

Como principal punto para evitar la contaminación de los criaderos cunícolas es prevenir la entrada de nuevos animales de dudosa procedencia

Coccidiosis

La coccidiosis es:

es una enfermedad parasitaria producida por distintas especies del género Eimeria spp, estos microorganismos pueden causar infecciones de diferente severidad en los conejos

Como se contagia y transmite:

Debido a la coexistencia de diversos factores como lo son la presencia del agente biológico, el ambiente y un individuo susceptible de enfermar, hacen posible que la enfermedad pueda presentarse en un tiempo y lugar determinado

Lesiones:

Estas van desde petequias y equimosis, hasta la destrucción de las diferentes estructuras intestinales

Síntomas:

- Diarrea con presencia de sangre.
- Baja conversión alimenticia y de peso
- Puede llevar a los individuos infectados hasta la muerte

Diagnostico:

- Parte del diagnóstico de esta parasitosis
- La identificación de especies se basa en la ubicación y lesiones patológicas en el intestino
- De manera posterior los oquistes se hacen esporular para ser medidos e identificados a partir de los parámetros morfo métricos de referencia.

Se previene:

- La limpieza constante de jaulas
- El proporcionar alimento y agua libres de cualquier contaminación.
- Jaulas con pisos de alambre

clostridiosis

El Cs. es:

Se trata del "Clostridium perfringens", germen anaerobio estricto

Esta enfermedad afecta a los conejos adultos y también los gazapos

Causas:

Se puede pensar que el hecho de absorber por vía bucal el germen responsable no basta para desencadenarla

Síntomas:

- Distención abdominal.
- Deshidratación.
- Muertes en pocas horas.
- Se muestran indiferentes e inmóviles.
- Falta de apetito.
- Manchas en el pelo perianal.
- Heces oscuras o verdosas

lesiones:

La autopsia revela una abundancia de gases en el intestino delgado extremadamente dilatado y vacío de todo alimento

El hígado está descolorido, amarillento, con este aspecto de hígado cocido que caracteriza la acción de la toxina

Diagnostico:

Pese a la claridad de los síntomas y sobre todo de las lesiones, es necesario eliminar las infecciones ligadas al parto

El tratamiento es:

- La antibioterapi
- antibióticos (penicilina, cloranfenicol, tetraciclina)

urolitiasis

La urolitiasis es:

Se denomina Urolitiasis a la presencia de cálculos en el tracto urinario

Factores:

La dieta constituye uno de los principales factores asociados a la formación de sedimento urinario y urolitos en conejos

- Pienso de baja calidad
- Heno de alfalfa
- Premios ricos en calcio
- Piedras de calcio

Síntomas:

- Apatía.
- Perdida de apetito.
- Perdida de peso.
- Dificultad al orinar
- Orina con sangre
- Orina densa y blanquecina.
- Dermatitis perianal.
- Anuria.
- Postura encorvada.
- Cistitis

Diagnostico:

- Síntomas clínicos.
- Anamnesis.
- Exploración física.
- Radiografía.
- Ecografía.
- Uroanálisis

urolitiasis

La urolitiasis es:

La salmonelosis es una enfermedad zoonósica con gran implicación en salud pública causada por el género Salmonella, familia Enterobacteriaceae con numerosas serovariedades y que puede afectar a todas las especies de mamíferos

Como se contagia y transmite:

transmisión se da por contacto directo entre animales por vía feco-oral, vía aerógena y mediante fómites contaminados (calzado, vestimentas, vehículos, equipos, etc)

Prevención y control:

El control de la salmonelosis se basa en un enfoque completo desde la granja hasta la mesa, es decir a lo largo de toda la cadena alimentaria, siendo cada eslabón (explotación, industria, inspección de alimentos, comercialización de alimentos y los consumidores) importante en su prevención y control

Síntomas:

La manifestación más común de la enfermedad es la entérica, pero se puede observar un espectro muy amplio de síntomas clínicos que incluye septicemia aguda, aborto, artritis y enfermedad respiratoria.