



del alumno: Alfredo Vázquez Calvo

Nombre del tema: Patologías vistas

Parcial: 3.-

Nombre de la Materia: “Patologías y técnicas quirúrgicas en aves y conejos”.

Nombre del profesor: Mvz. Gonzalo Rodríguez Rodríguez.

Nombre de la Licenciatura: “Medicina veterinaria y zootecnia”

Cuatrimestre: 5.-

Lugar y Fecha de elaboración: 09/03/2024 Comitán de Domínguez Chiapas México

Patologías en conejos

Enteritis mucoide

Agente

Causante es clostridium haciendo que su toxina cruce la pared intestinal haciendo lesiones en los órganos.

Llega a

Estar provocada por el exceso de proteínas llamadas enterotoxemicas.

Generalmente está caracterizada por una atonía digestiva.

Tyzzer

Causado

Por un bacillus perfringes

Factores predisponentes

Como Estrés, densidad de explotación, cambios bruscos y dietas de altas proteínas.

Síntomas

Presentes como anorexia, debilidad, diarrea líquida pastosa y muerte de 12-72 hrs en casos agudos.

Pérdida de peso, diarrea líquida, muerte 6-8 semanas en casos crónicos.

Pseudotuberculosis

Causado

Por treponema cuniculli, también denominada espiroquetosis.

Periodo de incubación es de 5 a 10 llegando a multiplicarse en mucosa intestinal, íleon etc.

Originándose

En conejeras con mala higiene, haciendo que el organismo entre vía oral y mediante heridas.

Síntomas

Como falta de apetito, depresión, fiebre, diarreas, dolor abdominal etc.

Coccidiosis

Enfermedad

Que trata de un protozoo del genero eimeria, que parasita la mucosa intestinal.

Transmisión

Oro-fecal

Sx clínicos

Disminución de peso, falta apetito, heces blancas o líquidas, diarreas sanguinolentas etc.

Patologías en conejos

Clostridiosis

Agente

Causante es bacteria del genero clostridium.

Lega a provocar una disminución de movimientos en el intestino, haciendo una distensión abdominal. Deshidratación y heces oscuras verdosas.

Lesiones

En estómago y intestino delgado con alimentos no digeridos también puede presentar hemorragias internas.

Sífilis

Es

También llamada espiroquetosis caracterizándose con ampollas en genitales.

Agente

Causante por treponema cuniculli

Sx

Como lesiones costrosas en labios, parparos y piel.

Urolintiasis

Esta

Denominada así a la presencia de cálculos en el tracto urinario.

Las dietas son las principales causas de la formación de cálculos.

Sx

Como apática, sangre en orina, disminución de peso, dificultad al orinar, orina densa no defecaciones.

Salmonelosis

Esta

Enfermedad es acompañada de diarreas y abortos.

Agente

Causante es salmonella typhimurium y salmonella enteritidis.

Aunque es de baja prevalencia se llega a caracterizar por septicemias y muertes.