



Nombre de alumno: Alfredo Calvo Vázquez

Nombre del tema: súper nota de los temas vistos en clases

Parcial: 4

Nombre de la materia: Patología y técnicas quirúrgicas de aves y conejos

Nombre del profesor: Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Nombre de la licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 5

Grupo: a

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE AVES Y CONEJOS

Rinitis infecciosa y Neumonía

RINITIS / CORIZA / MOQUILLO. Es un proceso infeccioso que afecta principalmente las vías respiratorias altas del conejo. Este proceso es de evolución subaguda con difusión y contagio rápido. Se convierte normalmente en forma crónica de difícil curación, sobretodo si la localización es en senos y cornetes.



Para aliviar la tos o la secreción nasal, puede administrar comprimidos expectorantes. La inhalación de vapor de agua también disuelve la mucosidad de las vías respiratorias. Si los oídos o las vías respiratorias bajas están inflamados, el veterinario también suele administrar antiinflamatorios y analgésicos.



La neumonía en conejos es una enfermedad peligrosa y complicada. Se trata de una inflamación del tejido de los pulmones, debido a varios factores: Infección bacteriana o por hongos. Infecciones virales o problemas parasitarios



El agente que causa la neumonía en los conejos es la bacteria *pasteurella*, que tiene un periodo de incubación hasta de 15 días. Los exámenes que se pueden realizar para determinar la enfermedad son: Radiografías de pecho, que nos ayudan a identificar abscesos y lesiones.



Dermatofitosis

Se denomina tiña o dermatomicosis una afección fitoparasitaria de la piel que afecta a los conejos de todas las edades y de forma particular a los gazapos. La tiña tiene extraordinario interés por cuanto es una enfermedad muy insidiosa y transmisible al hombre. Las zonas más afectadas son la frente, órbitas, nariz, labios y base de las orejas, sin descartar su posible extensión a otras demarcaciones



hongos pertenecientes a los géneros *Trichophyton* y *Microsporum*. Las esporas de los hongos son muy resistentes al calor y a los antisépticos. Transmisión La infección natural de tiña se produce por contacto, abundando sobre todo en los animales estabulados.

transmitirse por mediación de utensilios contaminados: jaulas, ropas, tolvas, bebederos



INTRODUCCIÓN

La tiña o dermatofitosis es una enfermedad parasitaria de carácter muy contagioso que causa lesiones en la piel y que afecta no sólo al conejo, sino también a otras especies animales



Sarna en conejos

- Se designa con el nombre de **sarna** un complejo de afecciones cutáneas contagiosas producidas por la clase arácnida y por distintas especies de ácaros que se instalan más o menos profundamente en la piel -dermis y epi- dermis- y que son capaces de originar manifestaciones patógenas caracteri- zadas por prurito intenso,



Los conejos afectados suelen presentar un tono blanquecino alrededor de los ojos. También afecta a la boca, la nariz y los dedos del animal y produce un fuerte olor.

Papilomatosis

El virus del papiloma de Shope es un virus de ADN y un miembro del grupo de los papovavirus.

PAPILOMATOSIS DEL CONEJO



La incidencia de la enfermedad es rara en conejos de laboratorio. Esta enfermedad se observa con mayor frecuencia en conejos de cola de algodón del Medio Oeste con brotes en conejos domésticos.

El tumor tiene la apariencia típica de un papiloma con rete pegs alargadas del epitelio que rodea los núcleos centrales del tejido conectivo. Un infiltrado de células inflamatorias leves se encuentra normalmente en las capas dérmicas subyacentes al tumor.



ABSCESO DENTARIO Y MALOCCLUSIÓN DENTAL

- Una de las enfermedades más comunes en los conejos es el sobrecrecimiento dental. Esta enfermedad afecta a los incisivos, a los molares y a los premolares.
- Los incisivos inferiores tienden a crecer hacia fuera, y los incisivos superiores hacia dentro. Podrían llegar a clavarse en el paladar de la mascota, así que para evitar daños y sufrimientos innecesarios es muy importante detectar esta enfermedad a tiempo.



Amputación de extremidades

- eliminar una extremidad dañada o enferma en perros y gatos es en una zona alta, donde la extremidad se une al cuerpo
- Manifestaciones clínicas Es posible que la amputación se recomiende debido al cáncer, un traumatismo grave o un defecto de nacimiento que ha generado una pata inútil. Se puede necesitar una amputación por otros motivos como una pata dolorosa

