



NOMBRE DEL ALUMNO: JORGE PORRAS JIMÉNEZ

NOMBRE DEL PROFESOR: GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOMBRE DEL TEMA: PATOLOGIAS EN CONEJOS

MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS EN AVES Y CONEJOS

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: MEDINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE: V

5 °A

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS A 06 DE MARZO DEL 2024



PATOLOGÍAS EN CONEJOS

ENFERMEDAD DE TYZZER

ES:

una infección bacteriana aguda. Las infecciones fatales esporádicas son frecuentes en los potrillos

LESIONES:
en el intestino y el corazón. El íleon terminal ciego y colon proximal se encuentran difusamente enrojecidos.

TRATAMIENTO Y CONTROL:

inicialmente con dextrosa al 50 % por vía intravenosa, seguida de dextrosa al 10 % (lentamente), sueros de otro tipo y antibióticos

ENTEROTOXEMIA

FACTORES:

falta de agua limpia y potable, pienso pobres en fibra, alimentación rica en carbohidratos y proteínas, lesiones renales

SÍNTOMAS

Parálisis intestinal, hipotermia, timpanización del abdomen, postración, los afectados no comen ni beben

PREVENCIÓN

administración de antibióticos de amplio espectro junto con sueros específicos, purgantes salinos

PSEUDOTUBERCULOSIS

se caracteriza por una variedad de fuentes y reservorios de infección. El depósito primario es el suelo

SÍNTOMAS

intoxicación, fiebre, lesiones del tracto gastrointestinal, hígado, piel, articulaciones y otros órganos.

PREVENCIÓN

El tratamiento de las complicaciones sépticas requiere el nombramiento de antibióticos resistentes a la beta-lactamasa,

COCCIDIOSIS

ES:

De origen parasitario, causadas por una serie de protozoos, se presentan en el hígado e intestino

SÍNTOMAS

La diarrea es el primer síntoma visible con la deshidratación cutánea

MORTALIDAD

Se produce durante un período relativamente corto (3-4 días) y sobreviene de forma brusca el 9º día después de la infestación.

SALMONELOSIS

Se caracteriza por septicemia y muerte, normalmente acompañada de diarrea en animales jóvenes y abortos en reproductoras.

En las formas crónicas: diarrea transitoria. El hígado y bazo aparecen aumentados de tamaño

Además es necesario que la pauta de vacunación y revacunación en sábanas a todas las conejas

SÍFILIS DEL CONEJO

Se caracteriza por la aparición de ampollas en los genitales. En casos severos pueden aparecer escamas o llagas en la boca

SÍNTOMAS

inflación rojiza de los genitales y de la región perianal. También hay infertilidad. Posteriormente en el macho aparecen lesiones granulosas

El uso de tetraciclina en el agua es otra forma de tratar la enfermedad, la que puede aliviar la diarrea en los animales tratados.

UROLITIASIS

ES:

presencia de cálculos en el tracto urinario. El proceso de formación de sedimento y urolitos es compleja

SÍNTOMAS

apatía, pérdida de apetito y de peso, dificultad al orinar, sangre en orina, orina densa y blanquecina.

PREVENCIÓN

proporcionar siempre agua limpia de mineralización baja y una dieta baja en calcio

ENTERITIS MUCOIDE

enfermedad localizada a nivel del aparato digestivo del conejo

SÍNTOMAS

pérdida del apetito, abatimiento, timpanismo, presencia de moco en heces, rechinar de dientes, hipotermia y deshidratación.

PREVENCIÓN

Evitar los factores de estrés o los elementos desencadenantes. Limpieza diaria de bebederos

BIBLIOGRAFÍA:

ANTOLOGÍA UDS