



**Nombre de alumno: LEONARDO
RAFAEL PINTO SANTOS**

**Nombre del profesor: GONZALO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

Nombre del trabajo: SUPERNOTA

**Materia: PATOLOGIA Y TECNICAS
QUIRURGICAS EN PORCINOS**

Grado: 5°

Grupo: "B"

Parasitosis y principales intervenciones quirúrgicas en porcinos.

Trichostrongilosis o gusano estomacal del cerdo.

La trichostrongilosis en cerdos es una enfermedad parasitaria causada por gusanos del género *Trichostrongylus*. Estos parásitos infectan el estómago e intestino delgado de los cerdos, causando síntomas como diarrea, pérdida de peso, anemia y en casos graves, incluso la muerte del animal. El tratamiento suele incluir desparasitantes específicos para eliminar estos gusanos.

Ascariasis - infección por áscaris.

La ascariasis en cerdos es causada por el parásito *Ascaris suum*. Estos gusanos infectan el intestino delgado de los cerdos, causando problemas como diarrea, tos, dificultad para respirar y en casos graves, obstrucciones intestinales. El tratamiento implica el uso de antiparasitarios efectivos contra este tipo de gusano.

Metastrongilosis - bronconeumonía verminosa porcina.

La metastrongilosis en cerdos es causada por parásitos del género *Metastrongylus*, que infectan los bronquios y pulmones de los cerdos. Esto puede provocar bronconeumonía, tos, dificultad para respirar y en casos severos, problemas respiratorios graves. El tratamiento incluye el uso de antiparasitarios específicos para eliminar estos gusanos.

Estrongilosis renal - gusano del riñón.

La estrongilosis renal en cerdos es causada por el parásito *Stephanurus dentatus*, que infecta los riñones de los cerdos. Esto puede provocar daño renal, síntomas como fiebre, pérdida de apetito, debilidad y en casos graves, insuficiencia renal. El tratamiento implica el uso de antiparasitarios adecuados para eliminar este tipo de gusano.

Cistecercosis porcina

La cistecercosis porcina es una enfermedad parasitaria causada por la forma larval del parásito *Taenia solium*. Los cerdos se infectan al consumir alimentos o agua contaminados con huevos de este parásito. Esta enfermedad puede afectar los músculos y órganos de los cerdos, causando síntomas como nódulos en la carne, debilidad, problemas neurológicos y en casos graves, la muerte. La prevención incluye medidas de higiene en la alimentación y el tratamiento puede implicar el uso de antiparasitarios bajo supervisión veterinaria.

Principales intervenciones quirúrgicas en porcinos

Castración: La castración es la eliminación de los testículos en los cerdos machos para controlar la reproducción y mejorar la calidad de la carne.

Criptorquidia: Es una condición en la que uno o ambos testículos no descienden al escroto y permanecen en la cavidad abdominal o inguinal. La cirugía es necesaria para corregir esto y evitar problemas de salud.

Hernias: Las hernias en cerdos pueden ocurrir en diferentes áreas, como la ingle o el ombligo, y requieren cirugía para reparar el tejido herniado y prevenir complicaciones.