



Nombre del alumno: Carlos
Fabrizio García Arias

Nombre del profesor: MVZ.
Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Patología y Técnicas
quirúrgicas en Porcinos

Grado: 5°


Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de abril de 2024.



ENFERMEDADES

EN CERDOS



TRICHOSTRONGILOSIS O GUSANO ESTOMACAL DEL CERDO

- Trastorno causado por la presencia y acción de parásitos del género *Trichostrongylus* que se alojan en el estómago de los cerdos
- Causa gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento.
- Algunas larvas pueden permanecer en la mucosa del estómago sin producir daño durante varios meses



ASCARIASIS DEL CERDO O INFECCIÓN POR ASCARIS

- Es una infestación causada por la presencia y acción de *Ascaris suum* principalmente en animales jóvenes.
- Las larvas durante su migración causan daño en el hígado y en los pulmones.
- El parásito adulto se localiza en el intestino delgado.
- Esta parasitosis se caracteriza por problemas digestivos, respiratorios y nerviosos así como retardo en el crecimiento.



METASTRONGILOSIS

- Se conoce también como bronconeumonía verminosa o estrongilosis respiratoria del cerdo, ya que cursa con un síndrome bronconeumónico.
- Parasitosis causada por varias especies de *Metastrongylus* siendo el más común *M. apri* el cual se aloja en la tráquea y en los bronquios pulmonares causándoles distintos grados de irritación e inflamación



ESTRONGILOSIS RENAL

- Parasitosis causada por la presencia y acción de *Stephanurus dentatus* en los riñones, de la grasa alrededor de ellos, uréteres o en los tejidos cercanos
- Se encuentra en grasa perirenal, riñones, hígado, páncreas, otros órganos abdominales, rara vez en pulmones, músculos lumbares y canal raquídeo.
- Las larvas migran por el hígado y páncreas durante 2 a 3 meses; algunas migran por el flujo sanguíneo.



CISTICERCOSIS PORCINA

- Trastorno causado por la presencia y la acción de estados larvarios de la *Taenia solium*, localizados en el cerdo principalmente en la lengua, músculos maceteros, corazón músculos diafragmáticos y en otros tejidos y cerebro
- El hombre se infecta cuando come carne de cerdo infestada con cisticercos



TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

- Castración: Implica la sujeción e inmovilización del lechón, la incisión del escroto con un bisturí, la exposición del testículo y la sección o desgarrar del cordón espermático
- Criptorquidias: Es un defecto de desarrollo en el cual los testículos no descienden y se mantienen en el abdomen o en el canal inguinal
- Hernias: Afección en la que los órganos internos, sobresalen a través de una abertura en las capas de músculo y tejido conectivo

