



**Nombre de alumno:
Yazmin Lucero Gutierrez Sanchez**

**Nombre del profesor:
Mvz. Gonzalo Rodriguez Rodriguez**

**Nombre del trabajo:
Supernota**



**Materia:
Cirugia en porcinos**

**Grado:
5°**

**Grupo:
B**

**Comitán de Domínguez Chiapas a 7 de
abril de 2024.**

PORCINOS



TRICHOSTRONGILOSIS

Trastorno causado por la presencia y acción de parásitos del género *Trichostrongylus* que se alojan en el estómago de los cerdos y que causa gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento.




ASCARIASIS – INFECCIÓN POR ASCARIS

Es una infestación causada por la presencia y acción de *Ascaris suum* principalmente en animales jóvenes. Las larvas durante su migración causan daño en el hígado y en los pulmones.



METASTRONGILOSIS

Parasitosis causada por varias especies de *Metastrongylus* siendo el más común *M. apri* el cual se aloja en la tráquea y en los bronquios pulmonares causándoles distintos grados de irritación e inflamación (bronconeumonía verminosa) la que según el estado inmunitario del animal puede complicarse con otros agentes virales y bacterianos.



ESTRONGILOSIS RENAL – GUSANO DEL RIÑÓN.

Parasitosis causada por la presencia y acción de *Stephanurus dentatus* en los riñones, de la grasa alrededor de ellos, uréteres o en los tejidos cercanos. síntomas: Parálisis del crecimiento, Pleuritis, Peritonitis, Daño renal.



CISTECERCOSIS PORCINA.

•Trastorno causado por la presencia y la acción de estados larvarios de la *Taenia solium*, localizados en el cerdo principalmente en la lengua, músculos maceteros, corazón músculos diafragmáticos y en otros tejidos. Síntomas: Problemas al masticar, Problemas y lesiones en la lengua, Problemas al tragar, Tos, Dificultad para caminar, Diarreas, Parálisis.



PRINCIPALES INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN PORCINOS (CASTRACIÓN, CRIPCORQUIDIOS, HERNIAS).

Criptorquidia:

- Es la consecuencia de un defecto en el descenso de uno o de ambos testículos hacia el escroto durante los dos primeros meses de vida.
- Un testículo abdominal refleja una falla para iniciar o completar la translocación abdominal, de tal manera que el testículo está en un sitio entre el riñón y la vejiga urinaria.






CASTRACIÓN

Es la extirpación o la supresión funcional de las glándulas genitales, se realiza con el objetivo de eliminar la fertilidad de los machos para utilizarlos en otras opciones como la ceba o amaestramiento. La castración en cerdos es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpan o desactivan las glándulas genitales de los machos.



HERNIAS



Información Entre las muchas anomalías congénitas, las hernias umbilicales o inguinales son las más frecuentes. Se consideran defectos del desarrollo y tienen una heredabilidad muy baja. En algunas ocasiones, las hernias umbilicales pueden relacionarse con un verraco determinado. Estos reproductores deberían ser eliminados.

Existen dos tipos principales de hernias en cerdos:

1. Hernias umbilicales
2. Hernias inguinales