



Mi Universidad

porcinos

Adriana Guadalupe V. H.

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 4

Comitán de Domínguez, 10 de febrero de 2024

enfermedades porcinas

Rinitis atrófica

La rinitis atrófica es una enfermedad severa, infecto-contagiosa, de muy elevada prevalencia, que afecta al ganado porcino, ampliamente extendida a nivel mundial y que está adquiriendo cada vez más importancia debido a las graves pérdidas económicas en unidades de engorde porcinas.

- * Clínicamente ninguno.
- * Distorsión del hocico. (cerdas)
- * Estornudos.
- * Lagrimeo.
- * Descargas nasales, a veces con sangre.
- * Distorsión del hocico. (lechones y lactantes)

Neumonía enzootica porcina

El principal problema asociado a las infecciones por *Mycoplasma hyopneumoniae* es una enfermedad respiratoria crónica. Suele ser un patógeno que amplifica la severidad de otras infecciones incluyendo la gripe y PRRS.

- Los síntomas clínicos incluyen:
- * Puede desarrollar una neumonía aguda o crónica.
 - * Grave dificultad para respirar.
 - * Tos seca prolongada no productiva.
 - * Retardo del crecimiento
 - * Hipotermia
 - * Pelo hirsuto (áspero y duro)
 - * Mortalidad variable, dependiendo de las coinfecciones.

Pasterolosis porcina

- * Es una enfermedad bacteriana que es conocida como fiebre de embarque.
- * Son oportunistas ya que al comprometerse los mecanismos de defensa normales del aparato respiratorio pueden descender pasar a la tráquea, bronquios y bronquiolos ya sea mecánicamente o por vía linfática y por último coloniza el pulmón.

- síntomas
 - Tos seca.
 - Descargas nasales.
 - Adelgazamiento.
 - Neumonía.
 - ETAPA AGUDA.
 - Fiebre por arriba de los 40°
 - Disnea.
- Neumonía aguda

enfermedades porcinas

Influenza porcina.

• Enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a reproductores y cerdos en engorda y finalización. Conocida también como gripe porcina, afecta al aparato respiratorio y causa fiebre elevada

- Tos
- Estornudos
- Disnea-taquipnea (dificultad para respirar y de manera acelerada, "brinco")
- Descarga ocular-nasal
- Fiebre puede ser de 43° C
- Depresión, inapetencia y debilidad
- La mortalidad es baja si no se complica con bronconeumonía
- Los signos clínicos aparecen a partir de 1 a 3 días después del contagio

Tuberculosis porcina

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa de curso típicamente crónico que afecta a los animales domésticos, silvestres y al hombre. Se caracteriza anatomopatológicamente por un granuloma específico con tendencia a la caseificación. Es causada por bacterias clasificadas en el orden Actinomycetales, de la familia Micobacteriaceae, género *Mycobacterium*.

- * Las lesiones tuberculosas representan el prototipo de una inflamación crónica granulomatosa, la lesión inicial es microscópica y constituye lo que se llama el Folículo de Koster o granuloma tuberculoso.

Salmonelosis porcina

• Enfermedad bacteriana infecto-contagiosa con afecciones digestivas aunque también se manifiestan presentaciones septicémicas, respiratorias y rara vez, neurológicas, causada por varias especies del género *Salmonella*, puede afectar a cerdos de cualquier edad, principalmente a los destetados (fase de crecimiento y finalización).

- Fiebre (40.5° C)
- Deshidratación
- Debilidad y anorexia
- Pérdida del apetito.
- Cianosis (piel azulada)