

Enfermedades

en porcinos

1.

Trichostrongilosis

La trichostrongilosis porcina es una enfermedad parasitaria que afecta a los cerdos. Es causada por la infestación de nematodos del género *Trichostrongylus* en el tracto gastrointestinal del animal.

2. Ascariasis

La ascariasis porcina es una enfermedad parasitaria que afecta a los cerdos y está causada por el nematodo *Ascaris suum*. Los cerdos se infectan al ingerir los huevos del parásito que se encuentran en el suelo contaminado con heces de cerdo infectadas.

3. Metastrongilosis

La metastrongilosis porcina es una enfermedad parasitaria que afecta a los cerdos y está causada por diversos nematodos del género *Metastrongylus*. Estos parásitos infectan los pulmones y bronquios del cerdo, donde pueden causar una enfermedad conocida como neumonía verminosa.

4. Estrongilosis

La estrongilosis porcina es una enfermedad parasitaria que afecta a los cerdos y está causada por nematodos del género *Oesophagostomum*. Estos parásitos infectan el intestino grueso de los cerdos, donde pueden provocar inflamación, ulceración y hemorragia.

5. Cisticercosis

Es una enfermedad parasitaria causada por la infestación de cerdos con larvas de *Taenia solium*, un parásito cestodo. Los cerdos se infectan al ingerir alimentos o agua contaminados con huevos de *Taenia solium*, que provienen de las heces de seres humanos infectados con la forma adulta del parásito.

6. Castración

La castración en porcinos es un procedimiento quirúrgico comúnmente realizado en cerdos machos jóvenes para remover los testículos. Esto se hace típicamente para mejorar la calidad de la carne y reducir los comportamientos no deseados asociados con la madurez sexual, como la agresividad y el olor fuerte de la carne de los cerdos enteros.

7. Criptorquideos

En cerdos machos cuyos testículos no han descendido correctamente hacia el escroto, quedando retenidos en el abdomen o en el canal inguinal. Esta condición puede ser congénita o adquirida y puede afectar a uno o ambos testículos.

8. Hernias

Las hernias en cerdos son protrusiones anormales de tejido a través de una abertura en la pared del abdomen. Pueden ocurrir debido a una debilidad congénita en la pared abdominal o como resultado de lesiones o esfuerzos físicos.