



Nombre del alumno: Carolina  
Juarez Ruedas

Nombre del profesor: MVZ.  
Gonzalo Rodriguez Rodriguez

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Patologia y Técnicas  
quirúrgicas en Porcinos



Grado: 5°

Grupo: “B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de abril de  
2024.



# PARÁSITOS Y CIRUGIAS EN PUERCOS



## CISTICERCOSIS PORCINA

- Causado por la presencia y la acción de estados larvarios de la Taenia solium, localizados en el cerdo principalmente en la lengua, músculos maceteros, corazón músculos diafragmáticos y en otros tejidos
- El cerdo es sólo un huésped intermediario.
- SX: Problemas al masticar, Problemas y lesiones en la lengua, Problemas al tragar, Tos, Dificultad para caminar, Diarreas, Parálisis.





## ESTRONGILOSI RENAL

- Parasitosis causada por la presencia y acción de Stephanurus dentatus en los riñones, de la grasa alrededor de ellos, uréteres o en los tejidos cercanos.
- Las larvas migran por el hígado y páncreas durante 2 a 3 meses; algunas migran por el flujo sanguíneo
- SX: Parálisis del crecimiento, pleuritis, peritonitis y daño renal



## METASTRONGILOSI

- Parásito que se aloja en la tráquea y en los bronquios pulmonares
- Causando distintos grados de irritación e inflamación
- SX: Tos que se presenta roncas y seca, Disnea, Taquipnea, Secreciones nasales, mucosa o muco purulenta, Temblores, Fiebre, Raquitismo.




## ASCARIASIS

- Causada por la presencia y acción de Ascaris suum principalmente en animales jóvenes.
- Las larvas durante su migración causan daño en el hígado y en los pulmones.
- El parásito adulto se localiza en el intestino delgado.
- SX: Se puede apreciar el borde de los ojos o la parte interna del prepucio o la vulva de color amarillo (ictericia.), disnea, secreciones nasales



## TRICHOSTRONGILOSI O GUSANO ESTOMACAL

- Son parásitos que se alojan en el estómago de los cerdos y que causa gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento.
- Los cerdos se infestan al ingerir agua o alimentos contaminados con las larvas.
- SX: desgano, apetito variable, enflaquecimiento progresivo por la deficiente digestión de proteínas, mucosas pálidas



## CIRUGIAS

- CRIPTORQUIDIOS: Es la consecuencia de un defecto en el descenso de uno o de ambos testículos hacia el escroto durante los dos primeros meses de vida
- CASTRACIÓN: La castración se realiza quirúrgicamente, sin anestesia y durante la primera semana de vida del animal. Implica la sujeción del lechón, la incisión del escroto con un bisturí, la exposición del testículo y la sección o desgarrado del cordón espermático
- HERNIAS: Los antecedentes genéticos de la hernia son complejos y muchos genes participan en esta patología

