




Mi Universidad

PORCINOS

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 5

Comitán de Domínguez, 7 de Abril de 2024



porcinos

TRICHOSTRONGILOSIS

TRICHOSTRONGILOSIS O GUSANOS ESTOMACALES DEL CERDO. Trastorno causado por la presencia y acción de parásitos del género *Trichostrongylus* que se alojan en el estómago de los cerdos y que causa gastritis hemorrágica con la consecuente mala digestión y retardo en el crecimiento.



ASCARIASIS

La ascariasis es una infección causada por *Ascaris lumbricoides*, una lombriz intestinal, o, en algunos casos, por *Ascaris suum* (que causa ascariasis en cerdos). Las personas contraen la infección al ingerir huevos de la lombriz, por lo general en los alimentos.

METASTRONGILOSIS - BRONCONEUMONÍA VERMINOSA PORCINA

La metastrongilosis es una parasitosis pulmonar del cerdo y el jabalí causada por nematodos pertenecientes al género *Metastrongylus*. Se conoce también como bronconeumonía verminosa o estrongilosis respiratoria del cerdo, ya que cursa con un síndrome bronconeumónico.




ESTRONGILOSIS RENAL CERDOS

Parasitismo causado por la presencia y acción de las hembras de un parásito (*Strongyloide ransomi*) que vive y pone huevos fértiles en el intestino delgado de los cerdos sin aparearse con machos (hembras partenogénicas).

CISTERCEROSIS PORCINA

La cisticercosis es una infección parasitaria de los tejidos causada por los quistes larvarios de la tenia porcina. Estos quistes infectan el cerebro, los músculos y otros tejidos.



CIRUGIAS EN CERDOS

La castración quirúrgica de lechones es una práctica tradicional desde hace mucho tiempo y sigue siendo habitual en la mayoría de los países. Este procedimiento está motivado por la presencia de olor a verraco en la carne de algunos cerdos machos enteros. hernias. *Entre las muchas anomalías congénitas, las hernias umbilicales o inguinales son las más frecuentes. Se consideran defectos del desarrollo y tienen una heredabilidad muy baja. por lo cual se necesita de cirugía*

