



**Mi Universidad**

## **Pequeñas especies**

*Yuleni Antonia morales aguilar*

*Medicina veterinaria y zootecnia*

*Cuatrimestre 4*

*Comitán de Domínguez, 10 de febrero de 2024*

# CLASIFICACIÓN DE LOS PARASITOS INTESTINALES EN PERROS Y GATOS

## ENDOPARASITOS INTESTINALES PROTOZOARIOS

**PROTOZOARIOS.**  
Giardia  
Cryptosporidium  
Protozoarios  
Cystoisospora  
Entamoeba  
Balantidium  
Eimena

Signos clínicos: En la mayoría de los casos, la infección es subclínica, pero en el caso de animales inmunocomprometidos y en cachorros y gatitos coinfectados con otros patógenos digestivos (virus o bacterias), Giardia puede causar diarreas mucosas intermitentes o bien diarreas persistentes con esteatorrea, anorexia, vómitos, pérdida de apetito y apatía.

### QUE SON?

Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, unicelulares protistas; heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a veces mixótrofos; que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces, y como parásitos de otros seres vivos.

### MAS IMPORTANTES

Los protozoarios más frecuentes fueron Entamoeba sp, Isospora sp y Giardia sp en perros y los dos últimos en gatos.  
tx.  
Una opción es el fenbendazol (50 mg/kg, una vez al día durante cinco días; en algunos países solo existe autorización para tres días).

## ENDOPARÁSITOS EXTRAINTESTINALES NEMATODOS

dilofilaria  
Physalsptera  
Capillaria  
Dlectephyma  
Parasanema  
Spiracerca

### MAS IMPORTANTES

dilofilaria, capillaria, parsonema

### TX

La combinación de pamoato de pirantel, praziquantel y febantel se clasifica como antihelmíntico de amplio espectro contra nematodos y tenías gastrointestinales; es muy utilizada en caninos.

## ENDOPARASITOS INTESTINALES CESTODOS

Texmcoris  
Trichuris  
Texmcoris  
Trichuris  
Fahinocneus

### QUE SON

La infección por cestodos es relativamente común, aunque muchas veces el animal infectado no manifiesta síntomas. En los perros se presentan varias especies de cestodos. Estos pueden parecerse a pequeños granos de arroz y se muestran en solitario o formando una cadena, pudiendo encontrarlos en las heces.

### MAS IMPORTANTES

Trichuris  
Texmcoris

## TREMATODOS

Opisthorchis felineus

### SK

En la infección crónica, los síntomas pueden ser más graves y puede aparecer hepatomegalia y desnutrición.

### TX

- Praciquantel en dosis de 25 mg/kg por vía oral 3 veces al día durante 2 días
- Albendazol 10 mg/kg por vía oral 1 vez al día durante 7 días