





PATOLOGIA Y TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE PEQUEÑAS ESPECIES



Parásitos Intestinales

Áscaris

Habitan en el estómago y los intestinos y pueden alcanzar un tamaño considerable. Ponen huevos capaces de resistir mucho tiempo en el ambiente.

Anquilostomas

Son conocidos como "gusanos ganchudos" porque se fijan mediante la boca a la mucosa del intestino delgado, absorbiendo así sangre y líquidos.

Tenias

Son gusanos que se alojan en el intestino delgado y pueden alcanzar los 2 metros de longitud. En esta parasitosis tienen un papel muy importante las pulgas, ya que pueden ingerir los huevos de las tenias y transmitirlos a los perros si estos se las tragan.

Tricúridos

Son conocidos como "gusanos látigo" debido a su aspecto filiforme, pero con un extremo más grueso. Estos gusanos se sujetan a las paredes del intestino grueso y, aunque ponen menos huevos que otros parásitos, estos son capaces de sobrevivir durante años en el ambiente.

Hidatidosis

La hidatidosis es más frecuente en zonas rurales, especialmente si se alimenta a los gatos con las vísceras crudas de ovejas y cabras, sus larvas pueden afectar a las personas formando grandes quistes en distintos órganos..

Gusanos redondos


Estos parásitos intestinales en gatos se multiplican en el intestino y las larvas migran por el hígado y los pulmones antes de alojarse en el intestino delgado, formando grandes ovillos que pueden causar una obstrucción.

Gusanos planos

El *Echinococcus granulosus* es otro gusano plano que puede aparecer en los gatos. Estos parásitos son los principales responsables del quiste hidatídico en humanos.

Tenias

Las tenias en gatos pueden ser *Dipylidium caninum* y *Taenia taeniaeformis*. El primero se contagia por ingestión de pulgas y piojos contaminados; el segundo por ingestión de pequeños roedores y, a veces, conejos.



Parásitos en el ano

Los parásitos intestinales viajan por el intestino de los gatos, en los momentos en los que tu felino defeca, los parásitos se acercan a la zona del ano.