



NOMBRE DE ALUMNO: CARLOS FABRITZIO GARCIA ARIAS

NOMBRE DEL PROFESOR: SAMANTHA GUILLEN POHLENZ

NOMBRE DEL TRABAJO: MAPA CONCEPTUAL

MATERIA: PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE PEQUEÑAS ESPECIES

GRADO: 5

GRUPO: B

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A FEBRERO DEL 2024.

PARASITOS INTESTINALES

leeee

GUSANOS MÁS FRECUENTES EN CACHORROS

TOXOCARA CANIS Y TOXOCARA LEONINA EN PERROS y TOXOCARA CATI Y TOXOCARA LEONINA EN GATOS

Estos gusanos son adquiridos por el perro por ingestión de los huevos presentes en las heces de otros animales parasitados o bien desde la madre al cachorro en la placenta o por la leche.

Estos parásitos en particular los huevos que en abundancia pueden eliminar perros y gatos por las heces.

Esta familia de parásitos incluye varias especies de ANCILOSTOMA Y UNCINARIA. Son adquiridos por el perro mediante la ingestión de huevos que son puestos por estos gusanos adultos dentro del intestino de un perro y salen al exterior por las heces o también lo puede transmitir la madre al cachorro durante la lactación.

Los cachorros se contagian bien por ingestión de larvas presentes en las heces de otros perros, o bien por que estas larvas penetran la piel del perro.

La mejor prevención es evitar las pulgas y piojos en perros y gatos, utilizando insecticidas periódicamente (collares, pipetas, spray...).

Las lombrices redondas son el parásito intestinal más común en los gatos, afectando entre el 25% y el 75% de los gatos.

Los signos clínicos que presentan los gatitos afectados pueden ser vómitos, diarrea, estreñimiento o pérdida del apetito.

Si se dejan sin tratar, las infecciones por ascárides pueden causar anemia y esta puede llegar a ser mortal.

buena higiene y la limpieza diaria de la caja de arena son claves para controlar las infecciones por estos parásitos.

Los gusanos redondos adultos miden de 4 a 8 cm de largo, son de color crema y viven en el intestino del gato.

GIARDIA

La giardia es también un parásito unicelular que, si se ingiere, daña las paredes del intestino y reduce la absorción de nutrientes de los alimentos de la mascota.

Trematodo
gusanos planos que afectan principalmente en perros y gatos.

Protozoos
son parásitos internos que se alimentan en el interior del aparato digestivo de nuestros perros y gatos.
ejemplo:
Giardia, Coccidios

NEMATODOS

Los nemátodos son los parásitos intestinales más comunes en perros y gatos de todo el mundo.
ejemplo
Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina

Cestodo
tales como presas, pulgas, pescado crudo o despojos de carnicería. El más común es el Dipylidium caninum.