



Nombre del alumno: Carolina
Juarez Ruedas

Nombre del profesor: Samantha
Guillen Pohlenz

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Patología y Técnicas
quirúrgicas en Pequeñas
Especies

Grado: 5°

Grupo: "B"

CIRUGIAS

PROLAPSO VAGINAL

- PRESENTA UNA MASA ROSADA QUE PROTUYE A TRAVÉS DE LA VULVA
- SE DA EN HEMBRAS JÓVENES DE RAZAS GRANDES Y BRAQUICEFÁLICO LO QUE SUGIERE CIERTO COMPONENTE HEREDITARIO
- TX: CONSERVADOR PARA HEMBRAS GX O EL DUEÑO RECHAZA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS, SÓLO SE MANTIENE EL TEJIDO PROLAPSADO LIMPIO, HÚMEDO Y PROTEGIDO PARA EVITAR TRAUMATISMOS Y LESIONES
- OVERTOMIA: PARA HEMBRAS NO GX

FÍSTULA PERIANAL

- ES EL CÚMULO DE SECRECIONES Y PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS QUE AFECTAN LAS GLÁNDULAS SUDORÍPARAS APOCRINAS MUY NUMEROSAS EN LA ZONA PERIANAL
- EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN ES QUIRÚRGICO Y DEBE REALIZARSE LO ANTES POSIBLE
- HAY DIFERENTES CIRUGIAS COMO: LA RESECCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS LESIONES, TÉCNICAS DE CRIOCIRUGÍA CAUTERIZACIÓN QUÍMICA Y ELÉCTRICA O AMPUTACIÓN DE LA COLA Y ANTIOTERAPIA DURANTE ALGUNAS SEMANAS



OTOHEMATOMA

- ES EL ACÚMULO DE SANGRE LOCALIZADO A NIVEL SUBCONDRA O INTRACONDRA DEL PABELLÓN AURICULAR
- LA LESIÓN SE PRODUCE POR EL RASCADO Y MOVIMIENTOS BRUSCOS DE LA CABEZA O FACTORES COMO: PARÁSITOS, ALERGIAS Y PROBLEMAS DE SEBORREA
- EL TRATAMIENTO DEL OTOHEMATOMA, ADEMÁS DE RESOLVER EL PROBLEMA EN SÍ, DEBE SOLUCIONAR LA CAUSA SUBYACENTE DEL MISMO
- SE DA MÁS EN MACHOS QUE EN HEMBRAS Y EN ANIMALES DE EDAD AVANZADA QUE EN JÓVENES



ECTROPIÓN

- ES LA EVERSIÓN DEL PÁRPADO Y DEL BORDE PALPEBRAL, EL PÁRPADO INFERIOR CAE, DEJANDO AL DESCUBIERTO LA CONJUNTIVA.
- ALGUNOS INDICAN AL PROPIETARIO LAVAR CON MAYOR FRECUENCIA CON SUERO SALINO FISIOLÓGICO FRÍO, CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONGESTIÓN, HIDRATAR Y BARRER LAS PARTÍCULAS DE LA CONJUNTIVA
- LA CORRECCIÓN QUIRÚRGICA CONSISTE EN ELIMINAR UNA CUÑA DE TEJIDO DEL PÁRPADO INFERIOR Y UNIR LOS BORDES INCIDIDOS



ENTROPIÓN

- ES UNA INVERSIÓN HACIA EL INTERIOR DEL BORDE LIBRE DEL PÁRPADO
- EXISTEN DOS GRANDES TIPOS DE ENTROPIÓN: EL ENTROPIÓN CONGÉNITO Y EL ENTROPIÓN ADQUIRIDO
- TX: CONSISTE EN RESECCIÓN DE UN TRIÁNGULO DE PIEL, PLASTIA DE Y A V O CANTOPLASTIA LATERAL

