



Nombre de alumno:
Carlos Fabrizio Garcia Arias

Nombre del profesor:
Samantha Guillen Polhez

Nombre del trabajo:
Supernota

Materia:
patologia en ovinos

Grado:
5

Grupo:
B

Comitán de Domínguez Chiapas a 20 de Enero
de 2024.

ENFERMEDADES EN OVINOS

BOTULISMO

- No es una enfermedad zoonótica
- Los pacientes presentan: dificultad al moverse, inquietud, falta de coordinación, ataxia.
- El método más eficaz y económico del control del botulismo es la aplicación de vacunas que conforman toxoides.



CARBON SINTOMÁTICO

- La bacteria como tal se encuentra en los intestinos y en algunos órganos de los animales.
- El síntoma más común es encontrar animales muertos
- Los vacunos afectados, están deprimidos, tienen fiebre y paran de rumiar.
- No es zoonótica.



EDEMA MALIGNO

- Se puede observar alguna sintomatología de 12-48 horas luego de ser realizado los manejos.
- En la zona de entrada (herida) se ve hinchazón y la piel tirante.
- Muchas veces no se advierten estos síntomas y solo suelen observarse muerte en los animales.
- No es zoonótica



ENTEROTOXEMIA

- La enfermedad se manifiesta por trastornos nerviosos graves, enteritis hemorrágica, indigestión, intoxicación general del cuerpo.
- Si el tratamiento no se inicia a tiempo, la infección conducirá inevitablemente a la muerte de los animales agrícolas.
- No es zoonótica



HEPATITIS NECROTICA INFECCIOSA

- síntomas: Animales apáticos. Deprimidos, Convulsión, Marcha en círculos, Corderos que se dan cabezazos con objetos fijos y la muerte, la que se produce en 24 horas.
- No es zoonótica
- La muerte de los animales, se produce por la polifерación de estas bacterias en el hígado.



TETANOS

- El tetano se caracteriza por un curso clínico que generalmente lleva a la muerte de los animales en unos pocos días.
- Los síntomas consisten en: rigidez y convulsiones tónico-clónicas, postración y dificultad respiratoria.
- No es zoonótica



COLIBASILOSIS ENDOTOXICA

- Causa: enalostamiento deficiente, retención de meconio
- no es una enfermedad zoonótica.
- Se transmite por vía oral.



COLIBASILOSIS DIARREICA



- Los corderos presentan rápida deshidratación, sed acusada, apatía y debilitamiento.
- No es zoonótica
- Corderos de 1 a 3 días con diarrea amarillenta manchado la zona perianal.

COLIBASILOS SEPTISEMICA

- Se caracteriza por un curso clínico más agudo que la forma diarreica.
- Sx: Muchos animales no llegan a presentar diarrea y predomina un cuadro de incoordinación, deprecación, obnubilación, postración y muerte en pocas horas.
- no es zoonótica



DESINTERIA DEL CORDERO



- Sx: Zona perianal y cuartos traseros manchados por las heces.
- Causa: hasas intestinales desendidas.
- No es zoonótica