

**NOMBRE DE ALUMNO:
CAROLINA YASARET JUARES RUEDAS**

**NOMBRE DEL PROFESOR:
MVZ. SAMANTHA GUILLEN POLHEZ**

**NOMBRE DEL TRABAJO:
SUPERNOTA**

**MATERIA:
PATOLOGIA EN OVINOS**

**GRADO:
5**

**GRUPO:
B**

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 20 DE
ENERO DEL 2024.**

ENFERMEDADES COMUNES EN OVINOS

BOTULISMO

- Los pacientes presentan: dificultad al moverse, inquietud, falta de coordinación, ataxia.
- Se caracteriza por una parálisis motriz mortal en el ganado bovino, causada por la ingestión de toxinas en el alimento.



CARBON SINTOMÁTICO

- El síntoma más común es encontrar animales muertos.
- Los vacunos afectados, están deprimidos, tienen fiebre y paran de rumiar.
- No es zoonótica.



EDEMA MALIGNO

- Es una enfermedad infecciosa no contagiosa, que afecta al ganado bovino y otras especies.
- Signos: hinchazón, septicemia, shock tóxico-infeccioso.
- Se observan los síntomas de 12-48 hs.



ENTEROTOXEMIA

- Síntomas: Animales apáticos, deprimidos, convulsión, marcha en círculos, corderos que se dan cabezazos con objetos fijos y la muerte, la que se produce en 24 horas.
- No es zoonótica.



HEPATITIS NECRÓTICA

- Síntomas: Animales apáticos, deprimidos, convulsión, marcha en círculos, corderos que se dan cabezazos con objetos fijos y la muerte, la que se produce en 24 horas.
- No es zoonótica.



TETANOS

- Los síntomas consisten en: rigidez y convulsiones tónico-clónicas, postración y dificultad respiratoria.
- No es zoonótica.
- La mayoría de las veces la bacteria es introducida a través de heridas de castración, esquila e inyecciones de medicamento.



ENFERMEDADES COMUNES EN OVINOS

COLIBACILOSIS ENDOTÓXICA

- Se transmite por vía oral.
- El babeo se debe a la situación de hipoglucemia que sufren los corderos.
- Retención de meconio



COLIBASILOSIS DIARREICA

- La colibacilosis es la causa más frecuente de diarrea en los corderos neonatos.
- Los corderos presentan rápida deshidratación, sed acusada, apatía y debilitamiento.



COLIBASILOSIS SEPTISEMICA

- Muchos animales no llegan a presentar diarrea y predomina un cuadro de incoordinación, depreción, obnubilación, postración y muerte en pocas horas.



DESINTERIA DEL CORDERO

- Sx: Zona perianal y cuartos traseros manchados por las heces.
- Causa: hasas intestinales desendidas.
- No es zoonótica

