Adriana Guadalupe

Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre 5

Comitán de Domínguez,marzo de 2024

CONEJOS

ENFERMEDADES

ENTEROTOXEMIA

ES

Etiología. El agente causal de esta enfermedad es el Clostridium perfrigens en sus diferentes tipos. Dominan en el conejo el A y el B pero no hay que descartar el C y el D. La enterotoxemia afecta principalmente a las hembras jóvenes en la cumbre de sus primeras lactaciones pero no hay que olvidar que puede aparecer en machos y en las distintas fases de la vida del conejo.

TX

ES ACONSEJABLE EL SUMINISTRO DE PAJA DE BUENA CALIDAD. PROFILAXIS. LA MANERA DE PREVENIR ESTA GRAVE ENFERMEDAD CONSISTE EN EVITAR TODO TIPO DE STRESS QUE PUEDA DESENCADENARÍA Y AL MISMO TIEMPO VACUNAR A TODOS LOS CONEJOS DEMÁS DE TRES MESES DE EDAD.

ENFERMEDAD DE TYZZER

ES

La enfermedad de Tyzzer es una infección bacteriana aguda que afecta a muchas especies de animales y se presenta en todo el mundo. Las infecciones fatales esporádicas son frecuentes en los potrillos y las epidemias fatales ocurren en animales de laboratorio. La enfermedad es rara en perros, gatos y terneros.

TX

ES POCO LO QUE SE CONOCE ACERCA DE LA EFICACIA TERAPÉUTICA DE LOS ANTIBIÓTICOS, PERO SE SABE QUE ALGUNOS EMPEORAN LA ENFERMEDAD. CLOSTRIDIUM PILIFORME ES SENSIBLE A LA TETRACICLINA Y PARCIALMENTE SENSIBLE A LA ESTREPTOMICINA, ERITROMICINA, PENICILINA Y CLORTETRACICLINA; ES RESISTENTE A LAS SULFONAMIDAS Y AL CLORANFENICOL

PSEUDOTUBERCULOSIS

ES

La pseudotuberculosis es causada por Yersinia pseudotuberculosis , una bacteria bacilo gramnegativa con flagelos peritricquiales, pertenece a la familia de las Enterobacteriaceae. La cápsula no contiene La disputa no se forma Tiene propiedades morfológicas, culturales y bioquímicas similares a Y. Enterocolitic

TX

EL TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES SÉPTICAS REQUIERE EL NOMBRAMIENTO DE ANTIBIÓTICOS RESISTENTES A LA BETA-LACTAMASA, CUYA ELECCIÓN SE DETERMINA POR LA SENSIBILIDAD DEL ESTUDIO A LOS ANTIBIÓTICOS.

COCCIDIOSIS

ES

Son protozoarios que constituyen el filo más primitivo del reino animal. Son esporozoarios, esdecir parásitos que carecen de cilios y flagelos y que tienen a la vez una reproducción sexuada y asexuada.

SX

LA MAYORÍA NO SON ESPECÍFICOS DE LAS COCCIDIOSIS INTESTINALES. LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS QUE SE PUEDEN ENCONTRAR SON: LA DIARREA, EL ADELGAZAMIENTO, EL SUBCONSUMO DE ALIMENTO Y DE AGUA, EL CONTAGIO Y LA MUERTE.

CONEJOS

CLOSTRIDIOSIS

es

Etiología. El agente causal de esta enfermedad es el Clostridium perfrigens en sus diferentes tipos. Dominan en el conejo el A y el B pero no hay que descartar el C y el D. La enterotoxemia afecta principalmente a las hembras jóvenes en la cumbre de sus primeras lactaciones pero no hay que olvidar que puede aparecer en machos y en las distintas fases de la vida del conejo.

tx

Generalmente en las enterotoxemias agudas no ex iste tratamiento terapéutico eficaz debido a la rapidez con que cursa la enfermedad ya la acción de las toxinas producidas por los diferentes tipos de gérmenes.

SÍFILIS EN CONEJO

es

La sífilis en conejos no es una enfermedad grave, generalmente. Sobre todo afecta a animales jóvenes que se infectan de la madre en el nacimiento, como es el caso del pequeño gazapo que veis en las fotos. Se caracteriza por lesiones costrosas.

tx

use penicilina de larga duración, una vez a la semana durante tres semanas consecutivas

UROLITIASIS

es

denomina urolitiasis a la presencia de cálculos en el tracto urinario. El proceso de formación de sedimento y urolitos es complejo, y está relacionado principalmente por altas concentraciones de iones (principalmente el calcio) y de la agregación de los mismos formando cristales.

Tx

El tratamiento ideal consiste en identificar y eliminar los urolitos, proporcionar una analgesia adecuada y antibioterapia en caso necesario. Si existe fallo renal agudo o crónico se instaurará el protocolo adecuado para cada caso

SALMONELOSIS

es

Se trata de una bacteria que se encuentra en niveles moderados en la flora normal del ciego de animales sanos. El proceso se manifiesta cuan- do se produce un crecimiento exagerado de esta bacteria, que responde a su vez a dife- rentes factores favorecedores

sx

Provoca en gazapos enteritis- diarrea y vía septicémica puede colonizar el hígado, bazo, pulmón, cerebro, articulaciones y aparato reproductor causando metritis y mortalidad embrionaria en conejas, siendo este el principal cuadro clínico de las conejas