

WDS

PATOLOGIAS GENITOURINARIAS, DERMATOLOGICAS Y METABOLICAS EN CONEJOS

- **Alumna:** Paola Elizabeth Maldonado Cancino
- **Profesor:** Gonzalo Rodríguez Rodríguez
- **Materia:** Patología y Técnicas quirúrgicas en aves y conejos
- **Licenciatura:** Medicina Veterinaria y Zootecnia
- **cuatrimestre:** 5
- **Parcial** 4

PATOLOGIAS GENITOURINARIAS, DERMATOLOGICAS Y METABOLICAS EN CONEJOS

4.1 RINITIS INFECCIOSA Y NEUMONÍA

- El primer síntoma son estornudos frecuentes. Luego se puede desarrollar un prurito nasal; los conejos frotan la nariz contra objetos o con las extremidades anteriores.
- Luego puede aparecer una secreción nasal y conjuntivitis con lagrimeo. La nariz y las extremidades anteriores se ensucian con exudados.
- Por obstrucción en las vías respiratorias se pueden producir ruidos.
- En algunos casos muy graves puede haber casos de bronquitis, pleuritis y neumonía.



4.2 DERMATOFITOSIS.

afección fitoparasitaria de la piel que afecta a los conejos de todas las edades y de forma particular a los gazapos. La tiña tiene extraordinario interés por cuanto es una enfermedad muy insidiosa y transmisible al hombre. Las zonas más afectadas son la frente, órbitas, nariz, labios y base de las orejas, sin descartar su posible extensión a otras demarcaciones. Causa Los hongos causantes de la tiña son muy variados, aunque la mayoría de casos corresponden a infestaciones por hongos pertenecientes a los géneros *Trichophyton* y *Microsporum*. Las esporas de los hongos son muy resistentes al calor y a los antisépticos.

4.3 SARNA

La Otocariasis, sarna de la oreja o sarna auricular es una enfermedad parasitaria, significativa por las lesiones que causa al interior de la oreja. Al inicio de la enfermedad éstas son de color blanco-grisáceo, afectando generalmente al fondo y más adelante avanza la superficie alterada, la cual se vuelve oscura, aumentando los fenómenos inflamatorios por multiplicarse el número de oocistos y sus detritus, adquiriendo el conjunto un aspecto repulsivo




4.4 PAPILOMATOSIS

La incidencia de los papilomas se observan en zonas con poco pelo, como son los alrededores del ojo, orejas, labios y ano. Las verrugas empiezan en el punto de infección. Los papilomas cutáneos son diferentes del papiloma rectal. Este último se encuentra en el ano. Cuando su tamaño es grande o comienzan a sangrar, es importante eliminar toda la verruga, así como el tejido que une la verruga al recto (pedúnculos) para evitar la recurrencia.



4.5 ABSCESO DENTARIO MALOCCLUSIÓN DENTAL

El primer síntoma que detectaremos es que el conejo deja de comer heno y puede empezar a perder peso de forma paulatina. En ese caso ya hay daños sufridos por su mascota, así que lo mejor es que le realices chequeos mensuales nosotros mismos para comprobar el estado dental de tu mascota. Cuando nuestra mascota tenga esta enfermedad tendrá dificultades para comer, incluso para coger los alimentos y le va a producir molestias y dolor al masticar.



4.6 AMPUTACIÓN DE EXTREMIDADES

Las amputaciones parciales de extremidades y las prótesis (extremidades artificiales) en mascotas, son una nueva opción de tratamiento para algunos pacientes. Como ocurre con otros procedimientos, no es una buena opción para todas las mascotas ni para todos los dueños. El control del muñón y el uso de una prótesis requieren atenciones y cuidados diligentes a diario. Es posible que necesiten varias prótesis a lo largo de su vida.

