



Empadre corto en bovinos

Eduardo Javier Pulido Pulido
Wendy Yarenni Gómez López

¿QUE ES?

Consiste en mantener al semental separado de las hembras durante la mayor parte del año y únicamente permitir el contacto de este con las hembras en un período determinado para que las preñe y los partos ocurran en un período corto del año, que de manera general es de 60 a 90 días.



Pirámide de la producción

PIRÁMIDE DE LA PRODUCCIÓN

GENÉTICA

MANEJO

INSTALACIONES

ALIMENTACIÓN

SANIDAD

Genética

¿Qué es?

- La genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos



Las 6 esenciales

- 1) Mansedumbre
- 2) Fertilidad
- 3) Peso
- 4) Conformación
- 5) Producción de leche
- 6) Rusticidad

Manejo

¿Qué es?


- Se trata de un procedimiento mediante el cual se entra en contacto directo con el ganado para tener un control sobre ellos.



Manejo

El procedimiento que se le realiza al ganado:

- 1) Palpación
- 2) Sincronización
- 3) Monta natural y/o IA
- 4) Diagnostico de Gx
- 5) Partos
- 6) Destetes estratégicos



Instalaciones

Reproducción

- Prensa: Inmoviliza sin lastimarlas y evita estrés



Sanidad

- Manga: 1m de ancho x 2 de altura



Alimentación

- Es la ración diaria necesario para proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para el crecimiento, mantenimiento corporal y preñez.

- 1) Minerales
- 2) Vitaminas
- 3) Forrajes
- 4) Suplementación



Sanidad

- Abarca las enfermedades de los animales, así como la interacción entre el bienestar de los animales, la salud humana, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria.



VACUNA	PREVIENE	VÍA DE ADMINISTRACIÓN	REFUERZO	DOSIS
ADBAC Doble Bovina	P. Multocida y C. Chauvoei	Subcutánea o intramuscular	21 días cada 6 o 12 meses	5ml
ADBAC Triple Bovina	P. Multocida tipo A Y D, C. Chauvoei y C. Septicum	Subcutánea o intramuscular	21 días cada 6 o 12 meses	5ml
ADBAC 11 Vías	M. Haemolytica, Clostridium en Gral.	Subcutánea o intramuscular	21 días cada 6 o 12 meses	5ml
ADBAC Fiebre Carbonosa	Antrax y fiebre carbonosa	Subcutánea	21 días cada 12 meses	2ml

