



Mi Universidad

SUPER NOTA

Nombre del Alumno: López Porraz Danna Paola

Nombre del tema: Cáncer de cuello uterino

Parcial: IV

Nombre de la Materia: Fisiología

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5to

CANCER DE CUELLO UTERINO



CLASIFICACIÓN

¿QUÉ ES?

Es un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino

El cáncer de cuello uterino se clasifica, según el grado de avance de la enfermedad, en:

Neoplasia intraepitelial cervical no invasiva (NIC)

Es un término que se utiliza para describir los cambios anormales en las células escamosas del cuello uterino. La NIC no es un cáncer, pero puede progresar hasta convertirse en cáncer en el futuro.



SÍNTOMAS

En sus primeras etapas, el cáncer de cuello uterino a menudo no presenta síntomas. Síntomas que se puedan avanzar en la enfermedad avanzada incluyen:

- Sangrado vaginal anormal entre períodos menstruales o durante/después de mantener relaciones sexuales o hacer ejercicio.
- Dolor pélvico
- Secreción vaginal
- Dolor o incomodidad durante el sexo.



VACUNACIÓN

Actualmente se dispone de tres vacunas contra el VPH, las tres proporcionan protección contra el VPH 16 y el VPH 18.

DIAGNOSTICAR

El diagnóstico de cáncer de cuello uterino se basa en los resultados de los siguientes exámenes y pruebas:

TIPOS DE CÁNCER

- Tumor glandular (adenocarcinoma): Este subtipo representa el 20% y el 25% de los cánceres de cuello uterino
- Otros tumores epiteliales: Subtipos menos frecuentes incluyen carcinoma adenoescamoso, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma indiferenciado.
- Tumor escamoso: Este es el subtipo más común, representa entre el 70% y el 80% de los cánceres de cuello uterino



CAUSAS

La causa más significativa es la infección persistente por VPH

Factores que aumentan el riesgo	Factores que disminuyen el riesgo
Mayor exposición al VPH al sexo	Sexo vaginal sin penetración o relaciones sexuales de bajo riesgo
Sexo oral	Uso de preservativo
Sexo con múltiples parejas sexuales	Uso de preservativo
Sexo con una sola pareja sexual	Uso de preservativo
Sexo oral	Uso de preservativo
Sexo con una sola pareja sexual	Uso de preservativo
Sexo oral	Uso de preservativo
Sexo con una sola pareja sexual	Uso de preservativo
Sexo oral	Uso de preservativo
Sexo con una sola pareja sexual	Uso de preservativo

CRIBADO CERVICAL

El cribado cervical es una prueba para examinar el cuello uterino, es decir, la apertura del útero que se proyecta desde la vagina.


DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO

ESTADIFICACIÓN

La estadificación de un cáncer es una prueba que ayuda a determinar el estadio de un cáncer y a determinar el tratamiento más adecuado para el cáncer de cuello uterino. Otras técnicas de diagnóstico...




DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO





DAY



26 de marzo

Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello uterino

La prueba del Papanicolaou #PAP contribuye al diagnóstico precoz

Protégete en cada relación sexual. El VPH es responsable del 90% de los casos

Evitar iniciar relaciones sexuales y embarazarte a edad temprana



