

Mi Universidad

Nombre del tema: Supernota

Nombre del Alumno: Wendy Cárdenas Guillén

Nombre de la Materia: Fisiopatología

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería (LEN)

Cuatrimestre: 5to



Cáncer DEL CUELLO UTERINO



Cáncer del cuello uterino

Por lo general se trata de un cáncer de crecimiento lento que es posible que no presente síntomas pero puede detectarse a través de pruebas de cribado

Tipos de Cáncer Existen: **3**



Tumor escamoso: Es el subtipo más común y representa entre el 70% y 80% de cánceres

tumor glandular: Este se representa entre el 20 y 25%.

Tumores Epiteliales:

NIC: 1 Hasta un tercio del grosor del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales.

NIC: 2 entre un tercio y dos tercios del revestimiento que cubre el cuello uterino.

NIC: 3 El espesor total del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales

Clasificaciones

Síntomas del cáncer de cuello uterino

- Sangrado Vaginal anormal entre periodos menstruales durante/después de mantener
- Dolor pélvico
- Secreción Vaginal
- Dolor o incomodidad durante el sexo

Causas del cáncer de cuello uterino

La causa más común es la infección persistente por VPH y la mayoría de las personas entran en contacto con el virus durante su vida.



Cáncer DEL CUELLO UTERINO



Cribado

Este consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino para mostrar si hay marcadores de cáncer de cuello uterino, hasta hace poco la prueba de papanicolaou donde se realizaba la presencia de anomalías.

Vacunación contra el VPH

Actualmente se dispone de tres vacunas contra el VPH y las tres proporcionan protección contra el VPH16 y el VPH18. El efecto de la vacunación contra el VPH sobre la tasa de incidencias del cáncer aun no se conocen pero se espera que prevenga más del 70% de los cánceres




Examen Clínico



Técnicas

Las nuevas técnicas de imagenología están reemplazando gradualmente a los métodos antiguos proporcionando una información completa:

- Imagen por resonancia magnética
- Tomografía por emisión de positrones
- Tomografía computarizada



Causas del cáncer de cuello uterino

La causa más común es la infección persistente por VPH y la mayoría de las personas entran en contacto con el virus durante su vida.

