

Nombre del Alumno: Cesar Iván Espinosa Morales.

Nombre del tema: Patología del recién nacido

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Fisiopatología

Profesor: Felipe Antonio Morales Hernández



2.3. ICTERICIA

NEONATAL



Llamamos ictericia al signo consistente en coloración amarillenta de la piel y mucosas producida por aumento de los niveles plasmáticos de bilirrubina.



Se debe a la faita de vitamina K (interviene en la coagulación sanguínea). Cursa con sangrado cutáneo, digestivo

sanguínea). Cursa con sangrado cutáneo, digestivo e intracra-

neal. Hoy en día excepcional, por la profilaxis universal del RN administrando vitamina K intramuscular.

POLICITEMIA

Se define como hematocrito venoso >65% (los valores capilares -sangre de talón- suelen ser mayores).





De manera fisiológica, los RN presentan cifras bajas de glucemia durante las primeras boras de vida. Se considera

durante las primeras horas de vida. Se considera una concentra-

ción de glucosa en sangre venosa anormalmente baja: <40 mg/

dl en las primeras 24 horas de vida; <50 mg/dl

despue



HIPOCALCEMIA

Calcio sérico <7 mg/dl o calcio iónico <4 mg/dl (<1 mmol/L).

De manera fisiológica existe un descenso de la calcemia tras el

nacimiento, dando lugar en ocasiones a síntomas inespecíficos

PATOLOGIAS RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA O SDR TIPO 1 O IDIOPATICO

Cuadro de dificultad respiratoria característico del recién nacido prematuro (RNPreT), asociado a inmadurez pulmonar.

Causada por un déficit cuantitativo o cualitativo de surfactante

Cuadro clínico:

Dificultad respiratoria progresiva, Quejido espiratorio, Aleteo nasal, Retracción, Polipnea y Cianosis.

Tratamiento:

Prenatal, Manejo General, Surfactante Pulmonar Exógeno, Manejo Ventilatorio

TAQUIPNEA TRANSITORIA

Enfermedad benigna autolimitada obstructiva en recién nacidos a término o cercanos a termino

Causada por reabsorción diferida de líquido pulmonar fetal.

Cuadro clínico:

Taquipnea, retracción intercostal y subcostal, quejido, aleteo nasal y posible cianosis.

Tratamiento:

Oxigenoterapia

SX. DE ASPIRACIÓN FETAL

Cuadro de dificultad respiratoria secundaria, que ocurre en neonatos de términos o post términos.

Causada por la aspiración de líquido amniótico teñido con meconio intra útero o intra parto.

Cuadro clínico:

Taquipnea, aleteo nasal, retracciones, cianosis o desaturación, estertores, roncus e ictericia.

Tratamiento:

CPAP, Ventilación mecánica, OMEC