



**Nombre del alumno: Jennifer carbajal
mauricio**

Nombre del profesor: Felipe antonio Morales

Materia: Fisiopatología

Trabajo: Mapa conceptual

Cuatrimestre: 5 - "A"

LA GANGRENA DE FOURNIER

HISTORIA

Hipocrates en el siglo V A.C, describio una infeccion cutanea necrosante facial y por otra parte en el caso de las heridas perianales no las cerraba para que granularan por segunda intencion.

MELENEY

Describio la gangrena hemolitica estreptococica ahora llamada celulitis de meleney y cullen tambien en 1924 la gangrena bacteriana sinergica.

CONCEPTO

Es una fascitis necrosante, polimicrobiana sinergista del perineo y se caracteriza por endarteritis obliterativa de las arterias subcutaneas terminales que resulta en los tejidos.

FASCITIS TIPOS

- 1.-Polimicrobiana, puede ir de celulitis a miositis.
- 2.- estreptococica
- 3.- gangrena

GERMENES

- E. coli
- Enterococcus
- Streptococcus
- Candida
- Pseudomonas

TRATAMIENTO

Es de tipo medico-quirurgico los antimicrobianos deben cubrir el espectro de los germenes grampositivos , negativos y anaerobios e incluso los hongos

EJEMPLO

- Meropenem
- piperaciclina
- tazobactam
- clindamicina
- vancomicina
- daptomicina

EJEMPLOS

La necrosectomia, debridacion y drenaje de la zona afectada, habitualmente requiere de 5 pasos, puede completarse de cistostomia , colostomia y penectomia.