



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Hiber Alejandro Aguilar Hernández

Nombre del tema: mapa conceptual

Nombre de la Materia: fisiopatología

Nombre del profesor: Felipe Antonio morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Gangrena de fournier

Historia y terminologia

Hipocrates en el siglo V ac describió una infección cutánea nacosante facial

En 1848, Hebler reporto lo que llamo "fuego (quemadura)escrotal"

Pasteur y koch estudiaron varias gangrenas gaseosas, relacionándolas con la existencia de gérmenes anaerobia

Concepto y fisiopatologia

Es una fascitis necrosante ,polimicrobiana sinergitis del parineo

Se caracteriza por andarteritis obliterativa De las arterias sub cutáneas terminales

Los microorganismos anaeróbicos se Acumulan en el tejido subcutáneo producen hidrogeno y nitrogeno

frecuencia

Predomina en el sexo masculino

La menor incidencia en el sexo femenino puede explicarse por el drenaje de la región perineal

A través de las secreciones vaginales y en mayores de 50 - 60 años

Gangrena de Fournier

Factores predisponentes

Fournier describió sus casos como idiopáticos

Diferenció sus casos de la gangrena perineal asociada con

- Alcoholismo
- Diabetes
- Traumatismo urogenital

Cuadros clínicos

Puede manifestarse inicialmente solo con dolor local

Se ha dividido en 4 fases

Primera:
endurecimiento local,
prurito, edema y eritema

Segunda:
Manifestación inflamatoria regional

Tercera:
Evolución al estado de choque séptico en 50%

Cuarta:
Granulación seguida de reepitelización

Diagnóstico paraclínico

Los hallazgos de lab. Son inespecíficos:

- Anemia
- Leucocitos
- Trombocitopenia
- Anormalidades electrolíticas

Los estudios de imagen pueden ser radiográficos

simples

Tomografía computada

Gangrena de fournier

