



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Hiber Alejandro Aguilar Hernández

Nombre del tema: cuadro sinoptico

Nombre de la Materia: fisiopatología

Nombre del profesor: Felipe Antonio morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Artritis inflamatoria

Monoartritis

Es la presencia de síntomas y signos de inflamación en una sola articulación

Se clasifican según el tiempo de evolución

AGUDAS
GRAVES

Artritis infecciosa

Inflamación en las articulaciones producidas por

clínica y diagnóstico

Suele ser un cuadro febril agudo con monoartritis

Se afectan sobre todas las articulaciones

tratamiento

Debe ser inmediato para evitar la destrucción del cartilago

Gota

Es una artritis recidivante, aguda o crónica

clínica y diagnóstico

En el anciano difiere en varios aspectos de la presentación en px jóvenes

tratamiento

Tratamiento del ataque agudo, valoración de factores de asociado y contribuyentes

pseudogotas

Es una artritis por microcristales asociados con la calcificación

clínica y diagnóstico

Las tres formas más frecuentes de presentación

- Pseudogota
- Artropiada crónica asociada a artrosis
- Accidental asintomáticos

tratamiento

Es similar a la gota en px que presentan dolor crónico

Artritis inflamatoria

Artritis microcristalinas

Se caracteriza por el depósito de hidroxapatita

Clinica y diagnóstico

Pueden ser asintomáticas o no

tratamiento

Basado en analgésicos, Aines, corticoides tópicos y fisioterapia

poliartrosis

Se define como la presencia de inflamación en cuatro o más articulaciones

etiología

Son la artritis microcristalinas, las infecciosas, lupus

Actitud diagnóstica

Se debe realizar una historia clínica y exploración física completa

Artritis reumatoide

Se observa una inflamación simétrica de las articulaciones periféricas

Clinica y diagnóstico

La AR de presentación tardía en el anciano tiene un perfil clínico característico

tratamiento

Objetivos: son reducir o suprimir la inflamación, alivio del dolor y conservación de la función muscular

Síndrome RS3PE

Es un síndrome clínico heterogéneo, exclusivo de personas de edad avanzada

clínica

Se manifiesta habitualmente como una poliartrosis aguda simétrica de manos

tratamiento

Dosis baja de corticoides (prednisona 15-20 mg/día)