



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Cecilia Gabriela Pérez Vázquez

Nombre del tema: La gangrena de Fournier

Parcial: 3

Nombre de la Materia: fisiopatología II

Nombre del profesor: Felipe Antonio morales

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

CONCEPTO

Es una fascitis necrosante, polimicrobiana sinérgica, del perineo se caracteriza por endarteritis obliterativa de las arterias subcutáneas terminales que resulta en gangrena de los tejidos, los microorganismos anaerobios que se acumulan en el tejido

CLASIFICACIONES

- las fascitis necrosantes **en tipo I** (polimicrobiana, puede ir de celulitis a miositis)
- **Tipo II** (por estreptococos del grupo A, C o G)
- **TIPO III** (con afección del abdomen y el perineo escrotal y pene)

LOS GERMENES ENCONTRADOS SON

- E.coli (48%)
- Enterococcus faecalis (28%)
- streptococcus Grupo A (10-30%)
- clostridium
- vibrio
- aeromonas
- etc

DIAGNOSTICO PARACLINICO

los hallazgos de laboratorio como anemia
los quirúrgicos de tejido necrosante
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL por vías de infecciones como orquitis epididimitis erisipela etc

LA GANGRENA DE FOURNIER

FRECUENCIA

predominadas en el sexo masculino la menor incidencia es en las mujeres puede explicarse por el drenaje de la región perianal a través de las secreciones vaginales y mayor de 50-60 años

CUADRO CLÍNICO

puede manifestarse inicialmente solo con dolor local y fiebre por lo que si no se tiene presente pasar inadvertidos y no proporcionarse el **TRATAMIENTO** adecuado y oportuno como edema local, eritema induración equimosis.

las causas desencadenantes suelen ser traumatismos locales accidentales, como perforaciones del recto por cuerpos extraños inyecciones IV, de cocaína lecciones coita.

FACTORES Y CAUSAS

se debe señalar que fournier como idiopático en jóvenes en su momento se diferenció con casos de gangrena perianal asociada con la diabetes, alcohol, traumatismos,

FRECUENCIA

predomina en el sexo masculino, la menor incidencia en el sexo femenino.

en mayores de 50-60 años

FACTORES DE RIESGO

Fournier descubrió sus casos como idiopáticos en gente joven previamente sana.

la gangrena perianal asociada con diabetes alcoholismo o traumatismo

4 FACES

- primera de 24-48 horas endurecimiento local, plurito, edema, eritema
- segunda inflamatorias invasiva
- tercera necrótica empeoramiento general
- cuarta restauración

LA GANGRENA DE FOURNIER

la colocación de un anillo alrededor del falo

sean encontrados afecciones subyacentes en los pacientes, como diabetes, (20-70%) alcoholismo, VIH/SIDA cáncer y etc.

CUADRO CLÍNICO

la gangrena puede manifestarse en solo con dolor local y fiebre el cuadro puede tener una evolución inicial de 2 a 7 días y el avance de la necrosis puede durar 2 a 3 cm/hora.

- el consumo de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa

las causas traumatismo locales, perforación del recto por cuerpo extraños etc

también sean reportado en la edad adulta.