



**Mi Universidad**

**Cuadro sinóptico**

*Nombre del Alumno: María Fernanda Dearcia Albores*

*Nombre del tema : Artritis*

*Parcial : II*

*Nombre de la Materia : Fisiopatología*

*Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández*

*Nombre de la Licenciatura : Enfermería*

*Cuatrimestre: 5A*



<Concepto

Los trastornos inflamatorios articulares son una causa frecuente de deterioro funcional en los ancianos. La principal queja suele ser el dolor

Monoartritis

Concepto

Una monoartritis se define como la presencia de síntomas y signos de inflamación localizados en una sola articulación.

Clasificación

según el tiempo de evolución, en agudas, con evolución de menos de 6 semanas de duración y crónicas, cuando tienen una evolución superior a 6 semanas

Artritis infecciosas

Concepto

Es la inflamación de las articulaciones producida por la infección de los tejidos sinoviales por bacterias piogénicas u otros microorganismos infecciosos

Tratamiento

Si la infección es fuerte se puede realizar un Gram, se indicará el tratamiento antibiótico según se hayan visto cocos Gram positivos: cloxacilina 2 g/4-6 h, o cefazolina 1 g/8 h, asociado o no a un aminoglucósido los primeros 3-5 días. Si se han visto cocos Gram negativos: ceftriaxona 2 g/día o cefotaxima 1 g/8 h. Si se han visto bacilos Gram negativos: ceftriaxona 2 g/24 h o cefotaxima 2 g/8 h o un carbapenem

Gota

Concepto

aguda o crónica, de las articulaciones periféricas, originada por el depósito de cristales de urato monosódico en y alrededor de las articulaciones y tendones, procedentes de los líquidos corporales hiperuricémicos supersaturados

Tratamiento

Respecto al alopurinol: se reservará para aquellos pacientes con 2-3 ataques con tofos o con evidencia radiográfica de daño articular La reducción de niveles de ácido úrico por debajo de 6 mg/dl eventualmente prevendrá nuevos episodios y resorción de tofos

(PFC)D

Concepto

Es una artritis por microcristales asociada con la calcificación del cartílago hialino y del fibroso (condrocalcinosis)

Tratamiento

El manejo en la fase aguda es similar a la gota en los pacientes que presentan dolor crónico: fisioterapia, analgésicos, colchicina a dosis bajas y AINEs

Artritis microcristalinas

Concepto

Se caracteriza porque el depósito de hidroxapatita es periarticular.

Tratamiento

Es insatisfactorio, basado en analgésicos, AINEs, corticoides tópicos y fisioterapia

Poliartritis

Concepto

presencia de inflamación en cuatro o más articulaciones. Si el tiempo de evolución es menor de 4 a 6 semanas, se habla de poliartritis aguda, y si es mayor, poliartritis crónica

Tratamiento

realizar una historia clínica y exploración física completa. Las pruebas complementarias recomendadas son: hemograma, VSG, orina elemental, bioquímica

Artritis reumatoide

Concepto

a inflamación simétrica de las articulaciones periféricas, que da lugar a la destrucción progresiva de las estructuras articulares y periarticular

Tratamiento

Existen tres grupos principales de fármacos para el tratamiento de la AR: AINEs, corticoides y fármacos modificadores de la enfermedad

Síndrome RS3PE

Concepto

síndrome clínico heterogéneo, exclusivo de personas de edad avanzada, caracterizado por poliartritis seronegativa con marcado edema de manos

Tratamiento

corticoides (prednisona 15-20 mg/día). Algunos autores añaden hidroxicloroquina. La duración media del tratamiento es de 9,5 meses (6-18 meses)

Lupus eritematoso sistémico

Trastorno inflamatorio crónico del tejido conjuntivo. Afecta sobre todo a las mujeres en edad fértil, pero las evidencias actuales apoyan el concepto que también puede tener su inicio en la edad adulta