



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: María Fernanda Dearcia Albores

Nombre del tema : Patología del RN

Parcial : II

Nombre de la Materia : Patología den niño

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura : Enfermería

Cuatrimestre: 5A

Patologías del RN

Inmadurez del centro respiratorio

Concepto

Alterna ritmo regular con episodios de apnea intermitente de 5-10 segundos de duración, seguidos de taquipnea compensadora durante 15 segundos.

Clasificación

- Apnea central.
Ausencia de esfuerzo inspiratorio.
- Apnea obstructiva.
Hay esfuerzo inspiratorio
- Apnea mixta.
Por combinación de ambos mecanismos.

Neumonía neonatal

Concepto

El incompleto desarrollo pulmonar típico del RNPT y la presencia de meconio en vía aérea son factores de riesgo que predisponen a esta patología.

Formas clínicas

- Neumonía de comienzo precoz.
- Neumonía de comienzo tardío.

Enterocolitis necrotizante (ECN)

Concepto

Inflamación y necrosis mucosa o transmural de la pared intestinal sobre todo de íleon distal y colon proximal,

Clínica

Comienza en las dos primeras semanas de vida con distensión y dolor abdominal, sangre en heces, vómitos, diarrea, fiebre, mal estado general e inestabilidad hemodinámica.

Ictericia neonatal

Concepto

signo consistente en coloración amarillenta de la piel y mucosas producida por aumento de los niveles plasmáticos de bilirrubina. En el recién nacido,

Clínica

Inicio en cara y conjuntivas y descenso progresivo hasta los pies a medida que aumentan los niveles (cuando llega hasta los pies la cifra estimada es de 20 mg/dl).

Enfermedad hemorrágica del RN

Concepto

Se debe a la falta de vitamina K (interviene en la coagulación sanguínea). Cursa con sangrado cutáneo, digestivo e intracraneal.

Tratamiento

Administración intravenosa de vitamina K y transfusiones de sangre y plasma fresco congelado.

Hipotiroidismo congénito

Concepto

Su causa más frecuente es la disgenesia tiroidea (tiroides ectópico).

Tratamiento

Levotiroxina sódica. Es muy importante tratar precozmente para evitar el retraso mental.

Hipoglucemia neonatal

Concepto

Se considera una concentración de glucosa en sangre venosa anormalmente baja: <40 mg/dl en las primeras 24 horas de vida; <50 mg/dl después.

Tratamiento

- Asintomático.
Alimentación precoz. Controles repetidos de glucemia.
- Sintomático o imposibilidad de vía oral.

Alimentación en el lactante

Lactancia Materna

- Fácilmente disponible.
- Muy digerible.
- Disminuye la incidencia de cólicos del lactante y de vómitos.
- Poco alergénica y estéril (no contiene bacterias contaminantes).
- Papel inmunógeno.

Lactancia Artificial

- Máxima asepsia (lavado de manos previo, biberón, tetinas, etc.).
- Preparar por cada 30 cc de agua un cacito raso de leche en polvo.
- Comprobar que la temperatura sea correcta.
- Se debe procurar que el niño expulse los gases a lo largo y al final de la toma.