Esquema nacional de vacunación

Vacuna BCG

Presentación	Dosis	Vía	Sitio de inyección
Polvo liofilizado para uso parenteral	Única dosis	Intradérmica	Cara externa del brazo derecho (inserción del músculo deltoides)

- **Indicaciones**
  - **Vacunar a niños y niños menores de 5 años, preferentemente menores de 14 años que no hayan sido vacunados.**
  - **Niños y niños no vacunados que tengan PPD no reactor y estén expuestos a personas con tuberculosis.**
- **Complicaciones**
  - **Embarazo.**
  - **Personas enfermas de leucemia, linfomas, neoplasias malignas.**
  - **Personas con tratamiento inmunosupresor, evitar la vacunación durante el tratamiento.**
  - **Pacientes con inmunodeficiencias congénitas.**
  - **Niños y niños con antecedentes de hermanos fallecidos precisamente por sospecha de EIP o con sospecha clínica o diagnóstico confirmado de EIP, es preferible descartar la enfermedad antes de vacuna.**

Vacuna anti hepatitis B

Dosis	Presentación	Vía	Sitio de aplicación	Vía de aplicación
Niños: 0, 1 y 6 meses. Adultos: 0, 1 y 6 meses. Inmunodeficientes: 0, 1, 2 y 6 meses. Hemodiálisis: 0, 1, 2 y 6 meses. Recuerdo: 5 años después de la primera dosis.	Suspensión inyectable en jeringa precargada. Suspensión inyectable en vial. Suspensión inyectable en vial para niños. Suspensión inyectable en vial para adultos. Suspensión inyectable en vial para hemodiálisis. Suspensión inyectable en vial para inmunodeficientes. Suspensión inyectable en vial para recuerdo. Suspensión inyectable en vial para niños y adultos. Suspensión inyectable en vial para niños y adultos. Suspensión inyectable en vial para niños y adultos