

Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del alumno: Castellanos Pacheco Diego Antonio

Tema: Gangrena de Fournier

Parcial: 3cer. parcial

Nombre de la materia: Fisiopatología II

Nombre del profesor: Morales Hernández Felipe Antonio

Nombre de la licenciatura: Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: 5to Cuatrimestre

La gangrena de Fournier


La gangrena de Fournier, a veces llamada enfermedad de Fournier, es una infección bacteriana de la piel que afecta a los genitales y el perineo es decir; el área entre el escroto y el ano en los hombres y entre la vulva y el ano en las mujeres. Los hombres son diez veces más propensos a desarrollar la enfermedad.

Síntomas

La enfermedad aparece primero como una simple inflamación del escroto, hinchazón, enrojecimiento, calor y dolor.

Crepitación

A veces el dolor disminuye a medida que la enfermedad progresa.



Los primeros síntomas físicos no indican la severidad de la condición.

Tejido muerto y descolorido

Dolor genital severo

Bordes violáceos y regiones enrojecidas adyacentes a la herida

Factores de riesgo



Alcoholismo y drogadicción



Diabetes mellitus y leucemia



Obesidad mórbida



Trastornos del sistema inmunitario

En mujeres

Son más susceptibles de desarrollar esta enfermedad las mujeres que han tenido:

Infección y abscesos en el área vaginal

Incisión quirúrgica en la vagina y el periné para evitar el desgarro de la piel durante el parto de un niño

Aborto que resulta en fiebre y una infección del revestimiento del útero

Extirpación quirúrgica del útero



En niños



En raras ocasiones, los niños pueden desarrollarla como complicación de una quemadura, la circuncisión o una picadura.