



Mi Universidad

SÚPER NOTA

Nombre del Alumno: BRENDA MAYARI ALVARADO BRAVO

Nombre del tema: CANCER UTERINO

Parcial: CUARTO PARCIAL

Nombre de la Materia: FISIOPATOLOGIA II

Nombre del profesor: FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

Nombre de la Licenciatura: LIC. ENFERMERIA

Cuatrimestre: QUINTO CUATRIMESTRE

CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Es un cáncer que se forma en los tejidos del cuello uterino



El cáncer de cuello uterino casi siempre es causado por la infección por el VPH, habiéndose detectado el VPH en el 99% de los tumores del cuello uterino

TUMOR ESCAMOSO:

Existen tres categorías de cáncer de cuello uterino

QUÉ DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER DE

Este es el subtipo más común, representa entre el 70% y el 80% de los cánceres de cuello uterino



TUMOR



. El adenocarcinoma comienza en las células cervicales que producen moco y otros líquidos

Glandular (adenocarcinoma): Este subtipo representa entre el 20% y el 25% de los cánceres de cuello uterino

OTROS TUMORES EPITELIALES

Estos subtipos menos frecuentes incluyen el carcinoma adenoescamoso, los tumores neuroendocrinos y el carcinoma indiferenciado

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICAL NO INVASIVA

NIC 2

Hasta un tercio del grosor del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales

NIC 1

Es un término que se utiliza para describir los cambios anormales en las células escamosas del cuello uterino

Entre un tercio y dos tercios del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales

NIC 3

El espesor total del revestimiento que cubre el cuello uterino tiene células anormales.

CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN ESTADIO TEMPRANO

CÁNCER DE CUELLO UTERINO LOCALMENTE

Estos cánceres normalmente son operables y el tratamiento primario suele ser la cirugía para extirpar el cáncer.

El cáncer de cuello uterino se describe como un cáncer en estadio temprano si el tumor no se ha diseminado más allá del cuello uterino

Se considera localmente avanzado si se ha diseminado fuera del cuello uterino hasta los tejidos circundantes

CÁNCER DE CUELLO UTERINO METASTÁSICO

El cáncer de cuello uterino se describe como metastásico cuando se ha diseminado a otras partes del cuerpo, como los pulmones

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER

. Los síntomas que se pueden observar en la enfermedad avanzada incluyen



Sangrado vaginal



Relaciones sexuales dolorosas



Problemas al orinar



Hinchazón en las piernas

QUÉ CAUSA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

- Dolor pélvico.
- Secreción vaginal.
- Dolor o incomodidad durante el sexo

Sangrado vaginal anormal entre períodos menstruales o durante/después de mantener relaciones sexuales o hacer ejercicio.

La causa más significativa del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por VPH

CÓMO SE DIAGNOSTICA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

El diagnóstico de cáncer de cuello uterino se basa en los resultados de los siguientes exámenes y pruebas:

Se utilizan para ayudar a diagnosticar el cáncer de cuello uterino y para tratar las células anormales del cuello uterino.

BIOPSIA DE CONO

Si experimenta síntomas de cáncer de cuello uterino, su médico llevará a cabo un examen clínico. Examinará su cuello uterino y su vagina y comprobará si hay anomalías

EXAMEN CLÍNICO

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Dependerá del tamaño, localización y estadio del tumor, así como de su estado general de salud y su estado físico.

CIRUGÍA

es una combinación de quimioterapia y radioterapia

QUIMIORRADIOTERAPIA

Es la extirpación de todas las células cancerosas. Esto puede incluir la conización (extirpación de una sección del cuello

QUIMIOTERAPIA

se puede utilizar para tratar a algunas pacientes con cáncer de cuello uterino localmente avanzado y como tratamiento paliativo en la enfermedad metastásica.

TERAPIAS DIRIGIDAS

Son medicamentos que bloquean las vías de señalización específicas de las células cancerosas que las estimulan a crecer