## EUDS Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Karla Sofia Tovar Albores

Nombre del tema: Gangrena de fournier

Parcial: Tercero

Nombre de la Materia: Fisiopatología


Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Quinto

## **Gangrena de fournier**





Vibrio)

La gangrena de Fournier es una fascitis necrosante, polimicrobiana sinergista, **Clasificaciones** ° FDA Complicadas No complicadas ° IDSA 1. Infección superficial no complicada 2. Infección necrosante 3. Infección asociada con mordedura 4. Infección de sitio quirúrgico 5. Infección en paciente inmunocomprometido ° Eron LJ y col. Clase 1: afebril, celulitis

Clase 2: febril, no inestable

una comorbilidad inestable

Clase 4: sepsis, infección

que amenaza la vida (por

ejemplo, fascitis

necrosante)

Clase 3: aspecto tóxico,

en el sexo femenino Puede Explicarse por el drenaje de la región perineal a través de las secreciones vaginales En mayores de 50-60 años; el reporte de casos en el sexo femenino Y en La etapa pediátrica es esporádico

**Factores predisponentes** del perineo; se caracteriza por endarteritis obliterativa de las arterias (de riesgo) y causas subcutáneas terminales, que resulta en gangrena de los tejidos. desencadenantes **Frecuencia** Fournier describió sus casos como idiopáticos, en gente joven Incidencia es de 1:7.500-Gangrena de Fournier 750,000 o 1.6-3.5: predomina en el sexo 100,000;59,62 la mortalidad masculino Previamente Sana cabe señalar que Fournier, en su momento La menor incidencia Calcula en general en 3-88%; habitualmente 20-40% Diferencio Sus casos de la gangrena perineal asociada con diabetes, alcoholismo o Estima que en todo el traumatismo urogenital mundo 13 millones Conocido Personas al año son En su manuscrito ofrece hospitalizadas por una visión de los fascitis necrosante antecedentes sociales y de la práctica de la medicina en ese momento Fournier describió las causas reconocidas de la gangrena perineal, incluida la colocación de un anillo

alrededor del falo, la ligadura del

prepucio

## Cuadro clínico

Gangrena de Fournier puede manifestarse inicialmente solo con dolor local



Fiebre, por lo que si no se tiene presente la posibilidad diagnóstica



Puede

Pasar inadvertidos y no proporcionarse el tratamiento adecuado y oportuno



Los datos

Subsiguientes pueden incluir: edema local, eritema, induración, equimosis, ámpulas, ampollas, necrosis con drenaje de material purulento, esfacelación; el cuadro clínico puede evolucionar hasta el estado de choque séptico e insuficiencia multiorgánica