



Mi Universidad

Cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Sofía Guadalupe Pérez Martínez

Nombre del tema: La gangrena de fournier

Parcial 3


Nombre de la Materia: FISIOPATOLOGIA II

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Lic. En enfermería

Cuatrimestre: quinto cuatrimestre

La gangrena de Fournier



La gangrena de Fournier

Diagnostico paraclinico

celulitis, epididimitis, orquitis, hernia inguinal complicada, absceso escrotal, fascitis necrotizante estreptocócica,

estudio de imagen:

radiográficos: radiografías simples y tomografía computada

tratamiento

médico-quirúrgico

Un esquema de ejemplo:

meropenem 1 g c/8 hora IV,
o piperacilina/tazobactam
3.37 g c/8 horas IV +
clindamicina 900 mg c/8
horas IV

Otras esquemas incluyen:

ciprofloxacina +
clindamicina;
ampicilina/sulbactam,
ticarcilina/clavulanato
+ aminoglucósido

Pronostico

se han utilizado varios índices

Parametros:

temperatura,
frecuencias cardiaca y
respiratoria

valores séricos de:

Na, K, creatinina, y
bicarbonato,
hematócrito y cuenta de
leucocitos.

En estudios comparativos:

el UFGSI parece ser superior al FGSÍ

pronóstico que se han utilizado son:

el Age-Adjusted
Charlson Comorbidity
Index (ACCI o CCI)

Los factores asociados con alta mortalidad incluyen:

fuente anorrectal, edad avanzada, enfermedad extensa, afectación de la pared abdominal o los muslos

La muerte usualmente resulta de:

afectación sistémica, como septicemia, usualmente por gramnegativos, coagulopatía, insuficiencia renal aguda