



### Cuadro sinóptico

*Nombre del Alumno: Yeyry Arlen Ramirez Roblero*

*Nombre del tema: Síndrome Nefrótico*

*Parcial: 2do parcial*


*Nombre de la Materia: Patología del Niño y Adolescente*

*Nombre del profesor: Verónica Liset Ventura Martínez*


*Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Enfermería*

*5to Cuatrimestre, Grupo B*

### 2.5.3.- Síndrome nefrótico.



### 2.5.3.- Síndrome nefrótico.



2.5.3.-  
Síndrome  
nefrótico.

Tratamiento

El tratamiento del síndrome nefrótico comprende el tratamiento de la enfermedad de fondo que lo está provocando y la administración de medicamentos.

Implica abordar la causa subyacente y controlar los síntomas.

Los medicamentos, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) y los diuréticos, son comunes para reducir la presión arterial y la cantidad de proteína en la orina.

Además, se pueden usar medicamentos para reducir el colesterol.

Atención  
de  
enfermería  
en  
pacientes  
con  
infecciones  
urinarias.

– Vigilar la eliminación urinaria, lo que incluye frecuencia, volumen, consistencia, color, con el fin de identificar posibles alteraciones

-Administración de medicamentos antibióticos, antipiréticos y analgésicos según lo prescrito para eliminar los síntomas mostrados por la proliferación microbiana.

– Enseñar a la persona los signos y síntomas de infección de vías urinarias para vigilar la efectividad de tratamiento y reconocer síntomas de recurrencia de la infección.

– Incentivar a la persona para que aumente la ingesta de líquidos adecuados para prevenir la infección y deshidratación.

– Explicar a la persona la necesidad de practicar pruebas diagnósticas para el seguimiento de la infección, tales como: Cultivo de orina y antibiograma, Análisis de sangre, Tinción del sedimento de la orina, cistoscopia: para descubrir la causa subyacente en caso de que la persona presente infecciones recurrentes .

–Enseñar a la persona la importancia de la adherencia al tratamiento hasta su terminación para evitar infecciones recurrentes.

– Orientar a la persona para que evite el consumo de refrescos de café, alcohol, ya que son irritantes urinarios.

– Vaciar la vejiga tan pronto e sienta la urgencia para reducir el número de bacterias y la estasis, además prevenir la reinfección.

– Incentivar a la persona para que consuma vitamina C para acidificar la orina y reducir el crecimiento bacteriano.

– Aplicación de calor local en el área supra púbica para aliviar el dolor.

– Enseña a la persona una buena higiene perineal y a limpiarse de adelante hacia atrás el perineo después de orinar o defecar, así como el correcto lavado de manos. Enseñar la importancia de usar ropa interior de algodón para así reducir la humedad perineal.

– Informar a la persona sobre signos de alarma que indiquen una infección de vías urinarias recurrentes.

# Bibliografía:

[d540cd45eb4b4ac11e85a69cd05206ef-LC-LEN504 PATOLOGIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE.pdf](https://plataformaeducativauds.com.mx/d540cd45eb4b4ac11e85a69cd05206ef-LC-LEN504_PATOLOGIA_DEL_NIÑO_Y_ADOLESCENTE.pdf)  
([plataformaeducativauds.com.mx](https://plataformaeducativauds.com.mx))