



Nombre del Alumno: LEANDRO LÓPEZ VELASCO

Nombre del tema: ENDOCARDITIS - PERICARDITIS.

Nombre de la Materia: ENFERMERIA CLÍNICA II

Nombre del profesor: MARIA JOSE HERNANDEZ MENDEZ


Nombre de la Licenciatura: ENFERMERIA

Cuatrimestre: 5°

Fecha:12/02/2024

Endocarditis

Infección del revestimiento interior del corazón que generalmente también afecta a las válvulas cardíacas.



La endocarditis generalmente ocurre cuando los gérmenes de cualquier parte del cuerpo viajan por la sangre y se adhieren a zonas dañadas del corazón. Las personas con válvulas cardíacas artificiales o dañadas, y otras enfermedades del corazón presentan un mayor riesgo.

Síntomas

Las personas pueden sufrir:
Todo el cuerpo: fiebre, escalofríos, fatiga, malestar o sudores nocturnos
También comunes: soplo cardíaco

TRATAMIENTOS

El tratamiento consiste en cirugía

El tratamiento principal consiste en administrar antibióticos. Algunas veces se necesita cirugía.



Síntomas (Endocarditis)

Los signos y síntomas comunes de la endocarditis incluyen:

- Fatiga y falta de aire
- Dolor en las articulaciones y los músculos
- Dolor en el pecho cuando respiras
- Un soplo cardíaco
- Síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y escalofríos
- Sudoraciones nocturnas
- Hinchazón en los pies, las piernas o el abdomen. Fuente: Mayo Clinic.

Tratamiento de Endocarditis

Ampicilina +
Aminoglicosido
(4 a 6 semanas)

- Empírico para válvula nativa
- Empírico para válvula protésica tardía
- Estafilococo en válvula nativa
- Enterococo
- Bacilos Gram (-)

Vancomicina (6 semanas)
+
Rifampicina + aminoglicosidos
(2 semanas)

- Empírico para válvula protésica temprana
- Estafilococo en válvula protésica

Penicilina G +
Aminoglicosido


- Estreptococos

Anfotericina B

- Hongos

PERICARDITIS

Inflamación y también irritación de la delgada membrana similar a un saco que rodea al corazón (pericardio).



SINTOMAS

Requiere diagnóstico médico

El síntoma más común es un dolor agudo y punzante en el pecho, que puede trasladarse hacia el hombro izquierdo y el cuello. La pericarditis suele presentarse de forma repentina, pero no dura mucho tiempo.

Las personas pueden sufrir:

Áreas de dolor: pecho

- Todo el cuerpo: fatiga o fiebre

También comunes: dificultad para respirar o opresión en el pecho



El tratamiento consiste en antiinflamatorios

La mayoría de los casos son leves y generalmente mejoran sin la necesidad de tratamiento. El tratamiento para los casos más graves puede incluir medicamentos y, con menor frecuencia, cirugía.



La pericarditis puede producirse por una infección viral o un infarto. En muchos casos, se desconoce la causa.



BIBLIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/pericarditis/symptoms-causes/syc-20352510>

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000182.htm>