COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.

FECHA:11/03/2024

MATERIA:PATOLOGIAS DEL NIÑO Y EL ADOLCENTE.

TEMAS: ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS.

NOMBRE DEL ALUMNO: MAYRANI LIZETH GARCIA GARCIA.

GRADO: 5 **GRUPO:** B

PROFESOR(A): MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ.


ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
TOS FERINA
Enfermedad tusigena.la tos permitira su diagnostico.
Tipos de fases:
Fase catarral,Fase paroxistica.
Fase de convalencia: Dura 2 a 4 semanas,la tos desaparece gradualmente.
Diagnostico: De laboratorio se realiza apartir de una muestra de moco.
Tratamiento: Sintomatico,etiologico,antibiotico y vacunas.
Faese catarral: los sintomas son leves ,precenta tos,rinorrea,febricula,congestion nasal.(Dura 2 semanas).
Fase paroxistica: Tos con precencia de congestion,cianosis facial,(dura 4 o 8 s).
DIFTERIA
Enfermedad infecciosa producida por unabasteria.
Afecta las vias respiratorias,la piel o puede ser asintomatica.
Tipos de difteria:Respiratoria,cutanea.
Diagnostico:sintomatologia ycultivo de la bacteria.
Tratamiento: Administracion de antitoxina difterica y antibiotico.
Bacteria responsable de la e.CORYNEBACTERUM DIPHTERIE.
Puede adquirrse por:gotitas de saliva,lesiones cutaneas.
Periodo de incubacion de 2 a 5 dias.
TETANOS
Enfermedad aguda y grave por clostridum tetanica.
Frecuente en: L naturaleza y el heridas en la piel y mucosas.
Periodo de incubacion de 3 a 21 dias.
Sintomas: Espasmos musculares,babeo sudoracion excesiva,fiebre..
Tratamiento: Antibioticos,reposo en cama,medicamentos neutrilizadores.
POLIOMELITIS
Enfermedad caracterizada por una paralisis flasida asimetrica.
Periodo de incubacion ante la vacunacion:
4-24 dias niño vacunado
11-58dias contactos
intomas:Dolor,fiebre,cansancio,nauseas,dolor de cabeza.
Que organos infecta la piolomelitis:
Oro faringe y tracto intestinal.
ESCARLATINA
Enfermedad exantematica infectocontagiosa.
Sintomas: Odinogagia,cefaleas,dolor abdominal,fiebre alta,nauseas.
Otros sintomas. Palidez peribucal,rptura de capilares,descamacion de la piel.


SARAMPION
Enfermedad contagiosa y grave causada por un virus.
Transmision: Se propoga por la tos y los estornudoscontacto directo con faringeas infectadas.
sintomas:rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.
Tratamiento: Buena nutricion ,ingesta de liquidos,antibioticos.
VARICELA
enfermedad benigna, propia de la infancia, caracterizada por un exantema maculo-vesiculo-costroso .
Periodo de incubacion de 14 a 16 dias.con u pico estacional en marzo y mayo.
Complicasiones frecuentes: Cutaneas,respiratorias,hematologicas.
Sintomas: Fiebre alta,dolores de cabeza,sarpullido,comenzon.
TUBERCULOSIS
Infeccion por el contacto de Mycobacterium tuberculosis,asintomatica sin signos.
Tratamiento: Asociar con varios farmacos
Diagnostico: Microbiano,con reposo en px con MT ,aislamiento y cultivo.
Manifestaciones cllinicas: sin sintomas.
Complicasiones: Disnea,bronquiectacia,hemoptisis,hipoxemia.
MENINGITIS
´Proceso inflamatorio del SNC causados microorganismos.
Manifestaciones clinicas,segun la edad del nño: R/N ,LACTANTE.
Tratamiento: Con antibiotico,monitorizar diurecis,escala de GLASWOW.