



Alumna: CRISOLITO GARCIA HERNANDEZ

Profesor: MARIA JOSE HERNANDEZ MENDEZ

Materia: ENFERMERIA CLINICA II

Tema: ENDOCARDITIS – PERICARDITIS

5 CUATRIMESTRE GRUPO C




LIC. EN ENFERMERIA

ENDOCARDITIS

La endocarditis generalmente ocurre cuando los gérmenes de cualquier parte del cuerpo viajan por la sangre y se adhieren a zonas dañadas del corazón




Es una enfermedad que se produce como resultado de la inflamación del **endocardio**, es decir, un proceso inflamatorio localizado en el revestimiento interno de las cámaras y válvulas, bien sea nativas o protésicos—cardíacas



Aunque la etiología más frecuente de la endocarditis es una enfermedad bacteriana, lo cierto es que los **hongos** y virus también son considerados como agentes causales de la enfermedad.

Se caracteriza por la colonización o invasión de las **válvulas del corazón** formando vegetaciones compuestas por **plaquetas**, **fibrina** y micro colonias de microorganismos y, ocasionalmente, células inflamatorias. Otras estructuras se pueden ver afectadas, como el **tabique interventricular**, las **cuerdas tendinosas**, el endocardio mural o aún implantes intracardiacos.


En otras ocasiones resulta imposible identificar el organismo responsable del desarrollo de la endocarditis. La mayor proporción de los casos de endocarditis son producidas por un pequeño número de bacterias, los cuales llegan al torrente sanguíneo por portales de entrada, como la cavidad bucal, la piel y las vías respiratorias.



Endocarditis infecciosa -bacteriana

Síntomas de la endocarditis

La infección se está separando en pequeños fragmentos, ocasionando una serie de accidentes cerebrovasculares




- La persona desarrolla insuficiencia cardíaca como resultado de los daños a las válvulas del corazón.

Tratamiento

Las personas que padecen esta afección con frecuencia necesitan ser hospitalizadas al principio para administrarles antibióticos por vía intravenosa. Es necesaria una terapia de antibióticos por largo tiempo para eliminar las bacterias de las cámaras y válvulas cardíacas



Orina de color anormal

- Escalofríos
- Sudoración excesiva (común)
- Fatiga
- Fiebre (común)
- Dolor articular
- Dolores y achaques musculares
- Sudores fríos
- Anomalías úngues (hemorragias en astillas bajo las uñas)
- Palidez
- Manchas cutáneas rojas e indoloras en las palmas de las manos y en las plantas de los pies (lesiones de Gateway)
- Ganglios rojos y dolorosos en las yemas de los dedos de la manos y de los pies (llamados nódulos de Osler)
- Dificultad para respirar con la actividad
- Inflamación de pies, piernas y abdomen
- Debilidad
- Pérdida de peso



PERICARDITIS

Es una afección en la cual la cubierta similar a un saco alrededor del **corazón (pericardio)** resulta inflamada. Puede ser causada por un **virus** u otra **infección**.



Causas


La pericarditis se produce con mayor frecuencia en hombres de 20 a 50 años de edad. En la mayoría de los casos se desconoce la causa de esta enfermedad, pero puede ser el resultado de:

- Una **infección vírica, bacteriana o fúngica**.
- Un **ataque cardíaco**.
- Una **metástasis** de un tumor maligno cercano.
- La **radioterapia** empleada para algunos tipos de **cáncer**.
- Una lesión en el **pecho**, el **esófago** (el conducto que transporta el alimento al **estómago**) o el **corazón**.
- El uso de ciertos tipos de medicamentos para debilitar el sistema inmunitario.

El síntoma principal de la pericarditis es un dolor agudo y punzante en el centro o el lado izquierdo del pecho (en algunos casos puede ser un dolor sordo).

Síntomas


El dolor puede irradiarse al cuello o el hombro izquierdo, y puede ser peor cuando se respira profundamente. El dolor típicamente es menor cuando se está sentado derecho o inclinado hacia delante, pero puede empeorar cuando la persona se acuesta



Líquido Pericárdico

Pericarditis crónica (dura más de seis semanas): resulta de la acumulación de líquido o de un engrosamiento del pericardio que puede producir retracción y calcificación del pericardio

- Fiebre
- Tos
- Dolor al tragar
- Dificultad para respirar
- Sensación de malestar general



Tipos de pericarditis:



Pericarditis aguda (dura menos de seis semanas): es una inflamación súbita del pericardio, dolorosa y que, a menudo, desemboca en derrames pericárdicos, es decir, en la acumulación de líquido y productos de la sangre como la fibrina o los glóbulos rojos y blancos, entre la membrana que está pegada al corazón y la que está en contacto con los pulmones

- [MedlinePlus/Pericarditis](#)
- [MedlinePlus/Trastornos del pericardio](#)
 - [DMedicina/Enfermedades:Pericarditis](#)

<https://www.ecured.cu/Pericarditis>

<https://www.ecured.cu/Endocarditis>

- Fowler VG Jr, Scheld WM, Bayer AS. Endocarditis and Intravascular Infections. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, Pa: Elsevier Churchill Livingstone; 2009.
- Karchmer AW. Infective Endocarditis. In: Libby P, Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, eds. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 8th ed. St. Louis, Mo: WB Saunders; 2007.
- Asociación Americana del Corazón. "Endocarditis bacteriana", (en español) (pdf). 2008