

NOMBRE DE LA DOCENTE: Hugo Alexander Pérez López

NOMBRE DE LA ALUMNA: Andrea Guadalupe Gómez Moreno

NOMBRE DE LA MATERIA: Introducción a la cirugía patología y técnicas quirúrgicas en equinos

NOMBRE DEL TRABAJO: Cuadro sinóptico

CUATRIMESTRE: 5

GRUPO: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de marzo de 2024

Sx: en casos agudos y sub agudos: fiebre, Es una enfermedad transmitida por transmisión son por las disminución del apetito, pérdida de peso, anorexia, **Piroplasmosis** garrapatas que actúan como vectores principalmente garrapatas letargo, elevación de pulso y de la cavidad equina e insectos. Es una infección aguda,_ vectores biológicos. También se respiratoria, congestión de las mucosas, petequias, subaguda o crónica. Causada por los puede transmitir de equino a anemia hemolítica etc. Tx: dipropionato, terapia de hematozoos Theileria equi y babesia equino. El periodo de incubación fluido y transfusión sanguínea varia de 10 a 30 aproximadamente caballi Puede Es una enfermedad infecciosa, aguda contagiosa Signos: Inapetencia, anorexia, ocurrir miocarditis Adenitis de los équidos, es causada por el streptoccocus hipertermia, secreción nasal serosa, pericarditis. TX: **Antibioticos** equina penicilina, sulfametazina trimetropin equi. Se transmite por las descargas purulentas, faringitis, laringitis graves, conjuntivitis, linfadenopatia. La muerte se da por sulfadiazina. sulfonamidas recipientes de alimentos y bebederos infección del sistema nervioso central. potrillos en lactancia y traqueotomía enfermedad zoonotica Es una aguda, SX: parálisis, trismo, dificultad en la deglución, tratamiento: Antibióticos, producida por las exotoxinas de clostridium hipersalivacion, paralisis al cuello y miembros cloranfenicol, metronidazol, tetani. Se transmite mediante elementos Clostridium anteriores, pirexia, postración, sudoración corticosteroide y analgésicos cortantes contaminados o por la mordedura de tetani profusa, hiperestesia, fotofobia y hiperacusia. animales y rara vez por picadura de insectos La infección se caracteriza por la aparición de ligera depresión Es una enfermedad infecciosa equina oxitetraciclina, En y anorexia, fiebre (38.9-41.7 °C). En esta fase, Transcurridas causada por Neorickettsia, El ciclo biológico animales que presentan 24-48 h puede aparecer una diarrea moderada o severa en el . de la bacteria causante de la fiebre de Enfermedades enterocolitis, es necesario Fiebre 60% de los caballos infectados que suele ir acompañada de Potomac no se conoce completamente, administrar tratamientos en equinos equina dolor abdominal moderado. Algunos caballos pueden aunque parece que el vector principal es un de fluidoterapia. desarrollar signos severos de infección o deshidratación. trematodo infectado con N. risticii. En caso de quedar gestantes se Es una enfermedad inflamatoria La infección se produce por contacto directo pueden producir abortos tempranos. durante la cópula o indirecto a través de fómites Los de las partes proximal y distal del Metritis TX: Los animales infectados se pueden machos son portadores asintomáticos. Los signos tracto reproductivo de la yegua vírica equina tratar mediante lavados clínicos característicos que afectan a las hembras causada por la bacteria Taylorella clorhexidina y aplicación de pomadas son endometritis, cervicitis, vaginitis, descarga equigenitalis, que suele provocar con nitrofurazona al 0,2% vaginal mucopurulenta e infertilidad temporal. una infertilidad temporal es una enfermedad contagiosa aguda o crónica Los signos iniciales son descarga vaginal, edema en genitales y en Durina Sacrificio, no los équidos reproductores, es una glándula mamaria. La aparición de placas cutáneas edematosas es enfermedad parasitaria venérea de equinos patognomónica de la enfermedad. Otros signos observados son 🔫 hay causada por el protozoo flagelado Trypanosoma pirexia, lesiones oculares, crujido articular, debilidad, ataxia, tratamiento equiperdum del orden Trypanosomatida parálisis facial unilateral, pérdida de peso, emaciación y anemia Depresión, Inapetencia, levantar las Se produce cuando los alimentos ingeridos por el caballo no Analgesia administrada patas delanteras, Mirar al flanco, circulan correctamente a través del intestino, Dieta alta en intravenosamente, Tumbarse más de lo habitual o en un Laxantes administrados grano y baja en forraje de calidad. se produce por Cambios" Cólico equino bruscos de alimentación, Problemas dentales, Parásitos, directamente el momento distinto del normal, Quejarse, en Falta de agua (limpia), Ingestión de arena y Estrés. estómago Sudar, Mayor frecuencia cardíaca. etc.