# Super Nota

*Nombre del Alumno: Jaime Arturo Salinas Ham*

*Nombre del tema: Estomago en Rumiantes*

*Parcial: 3° Unidad*

*Nombre de la Materia: Introducción a la Cirugía, Patología y Técnicas Quirúrgicas de Equinos*

*Nombre del profesor: Hugo Alexander Pérez López*

*Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia*

*Cuatrimestre: 5° Cuatrimestre*

Equinos

## PIROPLASMOSIS

La piroplasmosis equina se considera la enfermedad transmitida por vectores más importante que afecta a la especie equina en regiones con clima tropical, subtropical y templado

Es una infección intraeritrocítica, aguda, subaguda o crónica, causada por los hematozoos **Theileria equi y Babesia caballi**

La transmisión de la piroplasmosis equina está directamente influenciada por la dinámica de las poblaciones de garrapatas que actúan como vectores biológicos, las cuales a su vez están directamente influenciadas por las condiciones climáticas

## ADENTITIS

La adenitis equina es una enfermedad infecciosa, aguda, contagiosa de los équidos, de difusión mundial.

Caracterizada por la inflamación de las vías respiratorias superiores y con gran frecuencia abscesos en ganglios linfáticos

La infección es capaz de persistir en la faringe de caballos clínicamente normales hasta 10 meses y esto proporciona un medio de perduración de la enfermedad entre períodos en que la misma está latente

## CIOSTRIDIUM TETANIS

El tétanos es una enfermedad zoonótica aguda, producida por las exotoxinas (tetanoespamina) de Clostridium tetani perteneciente a la Familia Clostridiaceae.

La transmisión se produce generalmente por la inoculación accidental de las esporas mediante elementos cortantes o punzantes contaminados o por la mordedura de animales y rara vez, por la picadura de insectos.

La tetanoespasmina se une de forma irreversible a los receptores de las neuronas motoras, bloqueando las señales nerviosas a la musculatura, originando parálisis espástica con espasmos musculares dolorosos.

## METRITIS

Se trata de una enfermedad venérea contagiosa que afecta a los équidos causando un cuadro clínico caracterizado por endometritis, cervicitis, vaginitis, descarga vaginal mucopurulenta e infertilidad temporal en las hembras, siendo los machos portadores asintomáticos.

Es causada por la bacteria Taylorella equigenitalis, que suele provocar una infertilidad temporal. Es una infección no sistémica, cuyos efectos se limitan al tracto reproductivo de la yegua

La transmisión venérea directa también puede producirse por inseminación artificial utilizando semen infectado crudo, refrigerado y posiblemente congelado