


# UJVS

## Mi Universidad



**“Super nota”**

**Nombre del Alumno: Johan Rodrigues Morales**

**Nombre del tema: “Técnicas quirúrgicas”**

**Parcial: 4°.**

**Nombre de la Materia: “introducción a la cirugía, patología y técnicas quirúrgicas en equinos”**

**Nombre del profesor: “ Hugo Alexander Pérez Lopez”**

**Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnista.**

**Cuatrimestre: 5° “A”**





# “TECNICAS QUIRURGICAS”





## “ORQUIECTOMIA”

Es también conocida como castración, es un procedimiento quirúrgico habitual que tiene como finalidad la extirpación de los testículo indicado en casos de patología en los testículo o en alguna estructura asociada y así eliminando la fuente de producción de andrógeno y el comportamiento sexual masculino.

Existen varias técnicas que son:

- Técnica abierta: Es bajo sedación intravenosa y anestesia local en campo.
- Técnica cerrada: Esta suele realizarse en quirófano bajo anestesia general y con el caballo de cubito dorsal.
- Técnica semi-cerrada: esta es realizando una incisión de 2-3 cm en la túnica.



## “MONORQUIDIO”

Es una anomalía en la cual uno o ambos testículo no han descendido con normalidad hasta el escroto.

Donde la posición de los testículos en el embrión están muy próximo a los riñones.

Se puede realizar un procedimiento qx como:


- Abordaje quirúrgico estándar: con el caballo tendido sobre el lomo y con anestesia general se practica una incisión general por enema del anillo externo.
- Abordaje laparoscópico: Con el caballo de pre sedado sobre el lomo con anestesia general utilizando una cámara y equipo especializado se destiende el abdomen con dióxido de carbono estéril y se inserta una cámara por una incisión en el flanco u en le ombligo.



## “ORQUIDOPEXIA”

Esta es una operación para colocar los testículos no descendido a su posición correcta en el escroto. debido a que si no se realiza la orquidopexia puede provocar infertilidad, aumentar el riesgo de cáncer en los testículo y causar hernias en la ingle.

La cirugía trata de hacer una pequeña incisión en la ingle y se encuentra el testículo, se libera y se baja al escroto por lo general se realiza otra pequeña parte inferior del escroto para poder bajar el testículo al nivel correcto y coserlo en su lugar adecuado.



## “CESÁREA”

Es un procedimiento qx que se emplea en yeguas preñadas.

la cesárea en yeguas se realiza aproximadamente entre el 15 y el 25 % en un hospital veterinario, por la importante necesidad de anestesia , asepsia y seguridad de la cesárea a realizarse.

sin embargo abecés por la necesidad emergente la cesárea se realiza en campo para poder salvar al yegua y al potro.

