



Mi Universidad

Supernota

Nombre del Alumno: Francisco de Jesús Álvarez Velasco

Nombre del tema: Tipos de fracturas en equinos y sarna equina

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Introducción a la cirugía, patología y técnicas quirúrgicas de equinos

Nombre del profesor: Hugo Alexander Pérez López

Nombre de la Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Cuatrimestre: 5

Tipo de fracturas equinas

Las fracturas tipo slab

son lesiones comunes en caballos de carreras

generalmente estas fracturas involucran la porción distal del borde articular dorsal del radio

A nivel de la porción proximal y distal del hueso carpo radial e intermedio y el aspecto proximal del tercer hueso carpiano

En el caballo pura sangre inglés de carreras, las fracturas completas del tercer hueso carpiano son más comunes en el miembro

El standardbred de carreras, estas fracturas ocurren por igual en ambos miembros

Las lesiones que afectan el tercer hueso carpiano en caballos de carreras generalmente incluyen fracturas en fragmentos pequeños (chips) completas (slab) o conminutas

Las fracturas completas sagitales del tercer hueso carpiano son normalmente diagnosticadas mediante las proyecciones radiográficas lateromedial

Los signos clínicos de una fractura completa del tercer carpiano son similares a las fracturas de fragmentos condrales a nivel de la articulación intercarpiana con un grado variable de claudicación

La severidad de los signos depende del tiempo de evolución, tratamientos previos y compromiso articular

Las fracturas en un plano frontal son usualmente acompañadas por la distensión de la articulación intercarpiana y claudicación de tipo severo

Las fracturas en el plano sagital usualmente producen signos clínicos menos severos



Está producida por el ácaro "sarcoptes equi", muy conocido porque puede suele infestar también a animales domésticos y a seres humanos, aunque este tipo es específico de los equinos

Se caracteriza por producir un intenso picor y comienza afectando a las zonas de la cabeza, cuello, grupa y lomo para posteriormente extenderse al resto del cuerpo

Ese tipo de sarna produce pequeños bultos sobre la piel y alopecias

*Una vez identificado el tipo de ácaro causante de la sarna en caballos y, siempre bajo supervisión veterinaria, se prescribe un tratamiento específico que suele consistir en **desparasitadores acaricidas** de uso tópico u oral*

Debemos desinfectar el establo y los utensilios, silla de montar incluida, para eliminar el ácaro del ambiente ya que el contagio se produce por contacto directo

La prevención para **evitar la sarna en caballos** comprende las siguientes medidas, dirigidas a mantener la higiene y salud de los caballos para evitar la propagación del ácaro y, así, minimizar el riesgo de contagio a otros animales y la **reinfestación** del caballo enfermo:

- *Cumplir las desparasitaciones, vacunaciones y revisiones veterinarias marcadas por nuestro profesional de referencia.*
- *Mantener una higiene adecuada del caballo, prestando atención a los cepillados y baños.*
- *Dispensarle una alimentación de calidad, equilibrada, adaptada a sus necesidades y en cantidad suficiente*

