



**NOMBRE DE ALUMNO:
YAZMIN LUCERO GUTIERREZ SANCHEZ**

**NOMBRE DEL PROFESOR:
MVZ. HUGO ALEXANDER PEREZ LOPEZ**

**NOMBRE DEL TRABAJO:
INFOGRAFÍA**

**MATERIA:
PATOLOGIA EN EQUINOS**

**GRADO:
5°**

**GRUPO:
B**

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 09 DE FEBRERO DE 2024.

TIPOS DE FRACTURA Y SARNA EQUINA

TIPOS DE FRACTURA MAS COMUNES OBSERVADAS:

Fracturas del hueso del pedal:

Estos ocurren con mayor frecuencia si el caballo patea una pared o aterriza en una superficie irregular.



Fracturas de la cuartilla:

Afectan más comúnmente al hueso de la cuartilla larga, estos suelen ser longitudinales y se extienden hacia abajo desde la articulación del menudillo. Pueden ser incompletos o completos, desplazados o no desplazados, simples o conminutas.

Fracturas de los huesos del cañón:

También suelen ser longitudinales y pueden extenderse hacia la articulación del menudillo. El pronóstico de estas fracturas es malo, aunque algunas se han reparado con éxito mediante la fijación quirúrgica con placas y tornillos.



Fracturas de los huesos de la fémur:

Pueden ocurrir durante el ejercicio o después de una patada o una caída. La mayoría se cura con reposo, pero siempre deja un bulto ('férula') donde se forma la callosidad. Ocasionalmente, una fractura de fémur no sana (pseudoartrosis) y es necesario extirpar la parte inferior del hueso afectado para aliviar el dolor o la incomodidad asociados.

Fracturas de la pelvis:

Éstas son una causa común de cojera de las extremidades traseras en caballos jóvenes de rendimiento. La mayoría comienzan como fracturas por estrés incompletas y sanarán por completo si se diagnostican como tales y se les da un descanso completo y el tiempo adecuado.



SARNA EQUINA

La sarna es una patología que aún en la actualidad causa gran preocupación entre los cuidadores de animales y se asocia con unos cuidados deficientes y la posibilidad de contagio a otros animales, incluso a los seres humanos.



ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE SARNA EN CABALLOS SE DISTINGUEN LOS SIGUIENTES:

- Sarna sarcóptica, que es la producida por *Sarcoptes equi*.
- Sarna de los pies o coriódptica, es la producida por *Chorioptes equi*.
- Sarna psoróptica, causada por *Psoroptes equi*, que ataca zonas de pelo más largo o de articulación.

SINTOMAS:

- Prurito
- Zonas con alopecia más o menos extensas por la acción del parásito sobre la piel
- Heridas, costras o ampollas provocadas por el rascado constante.
- En casos más graves, el caballo puede presentar debilidad generalizada, anorexia, apatía, etc.



TRATAMIENTO:

se prescribe un tratamiento específico que suele consistir en **desparasitadores acaricidas** de uso tópico u oral.

