



Nombre del alumno: Mariana Aguilar
Jiménez

Nombre del profesor: Hugo Alexander
Pérez López

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Patología y Técnicas
quirúrgicas en Bovinos

Grado: 5°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de abril de 2024.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN BOVINOS




CORRECCIÓN DE FISTULA RECTOR VAGINAL

- Se evalúa el animal para la confirmación de la fístula y se introduce el dedo para confirmar la presencia y extensión del recto hasta el periné.
- Se incide el recto expuesto longitudinalmente entre las pinzas de Allis, consiguiéndose el acceso directo a la luz del mismo.
- Enseguida se procede a la sutura del recto a los bordes cutáneos mediante puntos simples con material sintético no absorbible
- Se procede a suturar la fístula rectovaginal por medio de puntos continuos y de preferencia con material sintético absorbible




ENUCLEACIÓN DEL OJO



- Consiste en la extracción del globo ocular, dejando el tejido adiposo y los músculos
- CAUSAS: Neoplasia intraocular con infección primaria o secundaria, Traumatismo sin recuperación ocular o Glaucoma no sensible a tx medico o quirúrgico
- RECUPERACIÓN: Antibióticos, Aines, Curaciones y Retirar suturas 2 o 3 semanas más tarde

RUMINOTOMIA

- Para remoción de cuerpos extraños del rumen o retículo o el vaciamiento del contenido ruminal debido al consumo de plantas tóxicas
- Se explora tanto el contenido ruminal como reticular a fondo por posible presencia de cuerpos extraños, los cuales deben ser retirados
- Es de gran importancia abrir, examinar el contenido y cerrar el rumen con un mínimo de contaminación de la cavidad abdominal



DESVIACIÓN DEL PENE



- Se puede emplear para la preparación de toros marcadores, ya que el traumatismo posoperatorio y tiempo de recuperación garantizan que el toro cumpla su función zootécnica
- El cuidado después de la cirugía incluye tener a los animales alejados de cualquier tipo de contaminación o humedad
- Es muy importante verificar que los toros orinen bien, teniendo cuidado que la porción del orificio uretral exterior no le genere complicaciones al animal para sacar el pene cuando quiera orinar

CESÁREA

- Es una incisión a través de la pared abdominal al interior del abdomen para aislar el útero. Se realiza otra incisión en el útero para sacar al ternero
- Es necesario practicar cesáreas a las vacas cuando el parto vaginal es demasiado complicado y no avanza en el tiempo previsto y, por lo tanto, puede poner en peligro la vida de la vaca o de su cría.
- El pronóstico de recuperación tras una cesárea suele ser bueno. Para evitar las cesáreas, la vaca y el toro que se apareen deben ser de tamaño similar y hay que controlar a las vacas con atención cuando se acerque el parto

