

CLÍNICA BOVINA



Hugo
Moña
Cano



5 B



UDS




COLIBACILOSIS EN BOVINOS



Que es ?...

La Colibacilosis Bovina o también llamada diarrea blanca, Diarrea de los recién nacidos, es una enfermedad multifactorial compleja de los terneros recién nacidos



Sintomas

En terneros y corderos, la diarrea se observa sobre todo en los primeros días después del nacimiento. Los animales producen grandes cantidades de heces con mal olor, de tipo pastosa a acuosa que varía de color amarillo pálido a blanco y puede contener manchas de sangre. En los casos agudos, la extensa pérdida de fluido conduce a una disminución marcada de peso corporal dentro de 6 – 8 h del inicio de la diarrea.



Prevención

- Revisar el sistema de explotación (manejo) para evitar que los adultos se mezclen con los recién nacidos.
- Limpiar los locales eliminando materias fecales y desinfectándolos, sobre todo cuando se vayan a introducir animales jóvenes.
- Bañar las hembras antes del parto y vigilar que tengan siempre las ubres limpias y desinfectadas.
- Usar instrumentos de limpieza exclusivos para cada sala o local.
- Combatir moscas, ratas, pájaros, cucarachas y otras plagas.
- Pauta vacunal adecuada.



Tratamiento

La primera medida de tipo medicamentoso debe estar orientada a combatir la deshidratación, La segunda medida terapéutica de importancia es la administración de un agente anti infeccioso.