



**NOMBRE DEL ALUMNO: CAROLINA JUAREZ
RUEDAS**

**NOMBRE DEL PROFESOR: MVZ. HUGO
ALEXANDER PÉREZ LÓPEZ**

NOMBRE DEL TRABAJO: SUPERNOTA

**MATERIA: PATOLOGÍA Y TÉCNICAS
QUIRÚRGICAS EN BOVINOS**

GRADO: 5°


GRUPO: "B"

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 07 DE ABRIL DE 2024.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

REPARACIÓN DE FÍSTULA RECTO-VAGINAL

1. Se introduce el dedo para confirmar la presencia y extensión del recto hasta el periné.
2. Se incide el recto expuesto longitudinalmente entre las pinzas de Allis, consiguiéndose el acceso directo a la luz del mismo.
3. Se procede a la sutura del recto a los bordes cutáneos mediante puntos simples con material sintético no absorbible
4. Se procede a suturar la fístula rectovaginal por medio de puntos continuos y de preferencia con material sintético absorbible



EXTRACCIÓN DEL GLOBO

1. Es la extracción del globo ocular, dejando el tejido adiposo y los músculos
2. Causada por: Neoplasia intraocular con infección primaria o secundaria, Traumatismo sin recuperación ocular o Glaucoma no sensible a tx medico o quirúrgico
3. Para la recuperación: Antibióticos, Aines, Curaciones y Retirar suturas 2 o 3 semanas más tarde

RUMINOTOMÍA

1. Sirve para remoción de cuerpos extraños del rumen o retículo
2. Así como el vaciamiento del contenido ruminal debido al consumo de plantas tóxicas
3. Es de gran importancia abrir, examinar el contenido y cerrar el rumen con un mínimo de contaminación de la cavidad abdominal



DESINFECCIÓN DEL PENE

1. Para la preparación de toros marcadores
2. El cuidado después de la cirugía incluye tener a los animales alejados de cualquier tipo de contaminación o humedad
3. Es muy importante verificar que los toros orinen bien, teniendo cuidado que la porción del orificio uretral exterior no le genere complicaciones

CESÁREA

1. Es una incisión a través de la pared abdominal al interior del abdomen para aislar el útero.
2. Se realiza otra incisión en el útero para sacar al ternero
3. Es necesario practicar cesáreas a las vacas cuando el parto vaginal es demasiado complicado y no avanza en el tiempo previsto
4. El pronóstico de recuperación tras una cesárea suele ser bueno.

