



Nombre del alumno: Carlos  
Fabrizio García Arias

Nombre del profesor: Hugo  
Alexander Pérez López

Nombre del trabajo: Supernota

Materia: Patología y Técnicas  
quirúrgicas en Bovinos

Grado: 5°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 07 de abril de 2024.

# TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN BOVINOS

## CESÁREA

- Es una incisión a través de la pared abdominal al interior del abdomen para aislar el útero. Se realiza otra incisión en el útero para sacar al ternero
- Es necesario practicar cesáreas a las vacas cuando el parto vaginal es demasiado complicado y no avanza en el tiempo previsto
- Para evitar las cesáreas, la vaca y el toro que se apareen deben ser de tamaño similar



## DESVIACIÓN DEL PENE

- Se utiliza para la preparación de toros marcadores, ya que el traumatismo posoperatorio y tiempo de recuperación garantizan que el toro cumpla su función zootécnica
- El cuidado después de la cirugía incluye tener a los animales alejados de cualquier tipo de contaminación o humedad
- Es importante verificar que los toros orinen bien

## CORRECCIÓN DE FÍSTULA RECTO VAGINAL

- Se evalúa el animal para la confirmación de la fístula
- Se introduce el dedo para confirmar la presencia y extensión del recto hasta el periné.
- Se incide el recto expuesto longitudinalmente entre las pinzas de Allis
- Enseguida se procede a la sutura del recto a los bordes cutáneos por puntos simples con material sintético no absorbible
- Se procede a suturar la fístula rectovaginal por medio de puntos continuos y de preferencia con material sintético absorbible



## RUMINOTOMIA



- Sirve para remoción de cuerpos extraños del rumen o retículo
- También el vaciamiento del contenido ruminal debido al consumo de plantas tóxicas
- Es de gran importancia abrir, examinar el contenido y cerrar el rumen con un mínimo de contaminación de la cavidad abdominal

## ENUCLEACIÓN DEL OJO

- Consiste en la extracción del globo ocular, dejando el tejido adiposo y los músculos
- CAUSAS: Neoplasia intraocular con infección primaria o secundaria, Traumatismo sin recuperación ocular o Glaucoma no sensible a tx medico o quirúrgico
- RECUPERACIÓN: Antibióticos, Aines, Curaciones y Retirar suturas 2 o 3 semanas más tarde

