

PATOLOGÍAS Y TECNICAS

QUIRÚRGICAS DE BOVINOS



HUGO
MORA
CANO



5 B

 UDS

PATOLOGÍAS

MÁS COMUNES EN TERNEROS

ENTERITIS NECROTICA

La enterotoxemia en terneros se transmite principalmente a través de la ingestión de esporas de *Clostridium perfringens*, una bacteria que se encuentra de forma natural en el ambiente y en el tracto gastrointestinal de los animales. La transmisión de la enfermedad puede ocurrir de varias maneras:

- Ingestión de esporas en el medio ambiente
- Cambios en la Dieta
- Estrés
- Inmunidad inadecuada



Los signos clínicos de la enterotoxemia pueden variar, pero suelen incluir inquietud, fiebre, diarrea líquida, y en casos graves, muerte súbita. Los terneros afectados a menudo se recuestan en posición esternal y muestran debilidad, a veces acompañada de rigidez muscular y arqueamiento hacia atrás de la cabeza y el cuello, un síntoma conocido como opistótonos.

TETANOS

El tétanos es producido por las toxinas del *Clostridium tetani*. Es una enfermedad altamente letal que se caracteriza por rigidez muscular y muerte por asfixia.

- Proceso febril (temperatura elevada).
- A veces se apartan de la manada y dependiendo de la cantidad de bacterias que el animal haya asumido, sintomatología puede ser relativamente más o menos grave y también más rápida o menos rápida.
- El animal va tomando una posición muy típica, muy patognomónica, conocida como Caballo de trola, por la posición rígida en sus cuatro miembros que tiene el animal, lo que se le dificulta moverse.
- Protrusión del tercer parpado. Los bovinos tienen como un tercer parpado interno; esta es una esclerótica de color blanco y cuando se presenta el tétano, se expone más de lo normal. Los animales parecen como si tuvieran los ojos tapados con algo blanco; eso es esclerótica. protrusión del tercer parpado.
- Rigidez en el cuello

