



PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE BOVINOS

UNIDAD II

GERARDO DE JESUS CERIBELLI SANTIAGO

ENFERMEDADES MAS COMUNES EN TERNEROS.

1 **Diarrea Neonatal**

La diarrea neonatal en terneros es un trastorno gastrointestinal común en los primeros días de vida. Se caracteriza por heces líquidas y frecuentes, generalmente causadas por infecciones virales, bacterianas o parasitarias. Esta condición puede llevar a la deshidratación rápida y requerir intervención veterinaria para prevenir complicaciones graves.

2 **Onfalitis**

La onfalitis en terneros es una inflamación del ombligo, comúnmente causada por la entrada de microorganismos. Requiere atención inmediata para evitar infecciones graves.

3 **Neumonía**

La neumonía en terneros es una inflamación de los pulmones, generalmente causada por bacterias, virus o factores ambientales. Puede provocar dificultad respiratoria y afectar el crecimiento. El tratamiento veterinario es esencial para prevenir complicaciones graves.

4 **Coccidiosis**

La coccidiosis en terneros es una enfermedad parasitaria que afecta el tracto intestinal, causada por protozoos del género Eimeria. Provoca diarrea, pérdida de peso y deshidratación. El control de la coccidiosis incluye medidas de higiene y, en casos graves, se puede requerir tratamiento veterinario.

5 **Hipotermia**

La hipotermia en terneros se refiere a una temperatura corporal demasiado baja. Puede ocurrir debido a exposición prolongada al frío, partos difíciles o falta de cuidado materno. La hipotermia puede llevar a debilidad, letargo y, en casos extremos, a complicaciones graves. Es esencial calentar al ternero y proporcionar cuidados veterinarios si es necesario.

6 **Hipoglucemia**

La hipoglucemia en terneros es una condición caracterizada por niveles bajos de glucosa en sangre. Puede ocurrir debido a una falta de ingestión de leche, malnutrición o problemas metabólicos. La hipoglucemia puede provocar debilidad, desorientación y convulsiones. Es crucial proporcionar una alimentación adecuada y, en casos graves, buscar atención veterinaria para corregir los niveles de glucosa.

7 **Enteritis Necrótica**

La enteritis necrótica en terneros es una inflamación del intestino que conduce a la muerte de tejido intestinal. Esta condición a menudo es causada por infecciones bacterianas, como Clostridium perfringens. Puede resultar en diarrea sanguinolenta, deshidratación y shock. La enteritis necrótica requiere atención veterinaria urgente para un tratamiento adecuado y minimizar las complicaciones.

8 **Tetanos**

El tétanos en terneros es una enfermedad causada por la bacteria Clostridium tetani. Se introduce generalmente a través de heridas o cortaduras en la piel. Provoca rigidez muscular, espasmos y dificultad para tragar. La prevención implica la vacunación adecuada y el cuidado de las heridas. El tratamiento incluye atención veterinaria urgente para controlar los síntomas y prevenir complicaciones graves.